		தொகுதிகள்					
குழுக்கள் (அ) நடத்து முறைகள்		1	2	3	…	m	$x_{i.}$
	1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	…	x_{1m}	$x_{1.}$
	2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	…	x_{2m}	$x_{2.}$
	3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	…	x_{3m}	$x_{3.}$
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	k	x_{k1}	x_{k2}	x_{k3}	…	x_{km}	$x_{k.}$
	$x_{.j}$	$x_{.1}$	$x_{.2}$	$x_{.3}$	…	$x_{.m}$	G

நாம் கீழ்காணும் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

x_{ij} - j ஆவது தொகுதியில் i ஆவது நடத்துமுறை மதிப்பு, $i = 1,2, ..., k; j = 1,2, ..., m$.

i ஆவது நடத்து முறைகளின் மொத்தம் - $x_{i.} = \sum_{j=1}^{m} x_{ij},\ i = 1, 2, ..., k$

j ஆவது தொகுதியின் மொத்தம் - $x_{.j} = \sum_{i=1}^{k} x_{ij},\ j = 1, 2, ..., m$

இங்கு $k \times m = n$, m = தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் k–நடத்துமுறைகளின் (குழுக்கள்) எண்ணிக்கை n = ஆய்வில் மொத்த கண்டறிந்த மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை

கண்டறிந்த மதிப்புகள் விவரங்கள் x_{ij} இல் உள்ள வேறுபாடு மொத்தம், கீழ்க்கண்ட மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

i) நடத்து முறைகளுக்கு இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள் (குழுக்கள்).

ii) தொகுதிகளுக்கு இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள்.

iii) நடத்து முறைகளுக்கும், தொகுதிகளுக்கும் இடையே, அல்லது குறிப்பிட்ட அமைப்பில் உள்ளடங்கிய வேறுபாடுகள்.

3.4.1 சோதனை வழிமுறைகள்

இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்விற்கான படிகள் பின்வருமாறு

படி 1 : இருவழி பகுப்பாய்வில் நடத்து முறைகள் மற்றும் தொகுதிகள் ஆகியவற்றிற்காக இரு வகையான கருதுகோள்கள் உள்ளன.

கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள்கள்

H_{01}: நடத்து முறைகளின் முழுமைத் தொகுதி சராசரிகளுக்கிடையேயான வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கதல்ல

H_{02}: தொகுதிகளின் முழுமைத் தொகுதி சராசரிகளுக்கிடையேயான வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கதல்ல

மாற்று கருதுகோள்கள்

H_{11}: ஏதாவது ஒரு சோடி நடத்து முறைகளின் சராசரிகள் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றுள்ளன.

H_{12}: ஏதாவது ஒரு சோடி தொகுதிகளின் சராசரிகள் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றுள்ளன.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 98 1/28/2020 6:41:48 PM