எடுத்துக்காட்டு 6.6

கீழ்க்கண்ட தரவுகளுக்கு, கீழ்க்கண்ட முறைகளில் நிறையிட்ட மொத்த குறியீட்டு எண்களைக் காண்க.

1. லாஸ்பியர் முறை
2. பாசியின் முறை
3. டார்பீஸ் பௌலியின் முறை
4. பிஷரின் விழுமிய முறை
5. மார்ஷல்–எட்ஜ்வொர்த்முறை

பொருட்கள்	2016–இல் விலை	அளவு	2017–இல் விலை	அளவு
A	2	8	4	6
B	5	10	6	5
C	4	14	5	10
D	2	19	2	13

தீர்வு:

வெவ்வேறான குறியீட்டு எண்களைக் கணக்கிடல்

பொருட்கள்	2016		2017		p_1q_0	p_0q_0	p_1q_1	p_0q_1
	விலை p_0	அளவு q_0	விலை p_1	அளவு q_1				
A	2	8	4	6	32	16	24	12
B	5	10	6	5	60	50	30	25
C	4	14	5	10	70	56	50	40
D	2	19	2	13	38	38	26	26
					$\sum p_1q_0 = 200$	$\sum p_0q_0 = 160$	$\sum p_1q_1 = 130$	$\sum p_0q_1 = 103$

(1) லாஸ்பியரின் குறியீட்டு எண்:

$$P_{01}^{L} = \frac{\sum p_1q_0}{\sum p_0q_0} \times 100$$

$$= \frac{200}{160} \times 100 = 125$$

(2) பாசியின் குறியீட்டு எண்:

$$P_{01}^{P} = \frac{\sum p_1q_1}{\sum p_0q_1} \times 100$$

$$= \frac{130}{103} \times 100 = 126.21$$

06_12th_Statistics_TM_Unit_6.indd 174 1/28/2020 6:44:26 PM