(1) லாஸ்பியரின் குறியீட்டு எண்:

$$P_{01}^{L} = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$$

$$= \frac{1185}{970} \times 100$$

$$= 122.16$$

(2) பாசியின் குறியீட்டு எண்:

$$P_{01}^{p} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \times 100$$

$$= \frac{11254}{920} \times 100$$

$$= 122.28$$

(3) பிஷரின் விழுமிய குறியீட்டு எண்:

$$P_{01}^{F} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \times \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}} \times 100$$

$$= \sqrt{\frac{1185}{970} \times \frac{1125}{920}} \times 100$$

$$= \sqrt{1.2216 \times 1.2228} \times 100$$

$$= \sqrt{1.49377} \times 100$$

$$= 1.2222 \times 100$$

$$= 122.22$$

எடுத்துக்காட்டு 6.8

கீழ்க்கண்ட தரவுகளுக்கு, 2014–ஆம் ஆண்டை அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்டு , டார்பீஸ்–பௌலியின் முறையில் விலைகுறியீட்டு எண்ணைக் கணக்கிடுக.

பொருட்கள்	2014		2015	
	விலை/கி.கி	அளவுகள் (கொள்முதல்)	விலை/கி.கி	அளவுகள் (கொள்முதல்)
எண்ணெய்	80	3	100	4
பருப்பு வகைகள்	35	2	45	3
சர்க்கரை	25	2	30	3
அரிசி	50	30	54	35
தானியங்கள்	35	2	40	3

06_12th_Statistics_TM_Unit_6.indd 176 1/28/2020 6:44:30 PM