தீர்வு:

நோயின் காரணமாக ஏற்பட்டஇறப்பு விகிதத்தைப் பின்வருமாறு காண்க.

இரு மாவட்டங்களிலும் நோயைப் பொறுத்து குறிப்பான இறப்புவிகிதம் காண, *SDR* (நோய்) என்பதில், *SDR* (நீரிழிவு), *SDR* (நுரையீரல் புற்றுநோய்) என்பதைக் காண வேண்டும். இதன் சூத்திரத்தில், D என்பது இறப்பையும் P என்பது மொத்தமாகப் பாதிக்கப்பட்டோரையும் குறிக்கும்.

மாவட்டம் A

$$SDR\ (\text{நீரிழிவு}) = \frac{D\ (\text{நீரிழிவு})}{P\ (\text{நீரிழிவு})} \times 1000$$

$$= \frac{325}{20000} \times 1000$$

$$= 16.25\ (\text{ஆயிரம் பேரில்})$$

$$SDR\ (\text{நுரையிரல்}) = \frac{D\ (\text{நுரையிரல் புற்றுநோய்})}{P\ (\text{நுரையிரல் புற்றுநோய்})} \times 1000$$

$$= \frac{300}{19500} \times 1000$$

$$= 15.38\ (\text{ஆயிரம் பேரில்})$$

மாவட்டம் B

$$SDR\ (\text{நீரிழிவு}) = \frac{D\ (\text{நீரிழிவு})}{P\ (\text{நீரிழிவு})} \times 1000$$

$$= \frac{400}{22000} \times 1000$$

$$= 18.18\ (\text{ஆயிரம் பேரில்})$$

$$SDR\ (\text{நுரையிரல்}) = \frac{D\ (\text{நுரையிரல் புற்றுநோய்})}{P\ (\text{நுரையிரல் புற்றுநோய்})} \times 1000$$

$$= \frac{380}{21225} \times 1000$$

$$= 17.90\ (\text{ஆயிரம் பேரில்})$$

இரு மாவட்டங்களிலும் நீரிழிவு நோயினால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம், நுரையீரல் புற்றுநோயினால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதத்தைவிட அதிகமாக உள்ளது. மேலும் இவ்விரு மாவட்டங்களை ஒப்பிடும்போது, மாவட்டம் B இல், மேற்கண்ட இரு நோய்களாலும் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக உள்ளது என்பதை அறிகிறோம்.

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 228 1/28/2020 6:45:54 PM