7. பெருங்கூறில், 5% மிகைகாண் நிலையில் இருமுனை சோதனையின் தீர்மானிக்கும் மதிப்பு

(அ) 1.645 (ஆ) 2.33

(இ) 2.58 (ஈ) 1.96

8. H_0: $\mu = \mu_0$ என்பதற்கு ஏற்ப $H_1 : \mu < \mu_0$, எனும் ஒருசோதனையில், மிகைகாண்மதிப்பு $\alpha = 0.01$ ஆக இருக்கும்போது, அதன் தீர்மானிக்கும் மதிப்பு

(அ) 1.645 (ஆ) –1.645

(இ) –2.33 (ஈ) 2.33

9. ஒரு கருதுகோள் சோதனையில், H_0: $\mu_0 = 45$, H_1: $\mu_0 < 45$ என்பதற்கு ஏற்ப நடத்தப்படும் சோதனை

(அ) இடதுமுனை சோதனை (ஆ) வலதுமுனை சோதனை

(இ) இருமுனை சோதனை (ஈ) ஒருமுனை சோதனை

10. மாற்று எடுகோள் $H_1 : \mu \neq \mu_0$, எனும்போது, தீர்மானிக்கும் பகுதியை நிர்ணயிப்பது.

(அ) இட, வல இருமுனை சோதனை (ஆ) இருமுனை சோதனை அல்ல

(இ) வலமுனை சோதனை (ஈ) இடமுனை சோதனை

11. சரியான கூற்றாக இருக்கும்போது, H_0 என்பதை மறுக்கும் பிழை,

(அ) முதல்வகைப் பிழை (ஆ) இரண்டாம்வகைப் பிழை

(இ) மாதிரியெடுத்தலில் பிழை (ஈ) திட்டப்பிழை

12. இன்மை கருதுகோள் H_0 என்பதைப் பொருத்து மாதிரி விகிதசமத்தின் திட்டப்பிழை,

(அ) $\sqrt{\frac{PQ}{n}}$ (ஆ) $\sqrt{\frac{pq}{n}}$

(இ) $\frac{PQ}{n}$ (ஈ) $\frac{pq}{n}$

13. முழுமைத் தொகுதி மாறுபாட்டு அளவைகள் தெரியாத போது, இரு முழுமைத் தொகுகளிலுள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை பற்றி அறியும் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

(அ) $\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}$ (ஆ) $\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}$

(இ) $\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$ (ஈ) $\frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}}$

14. முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் சமமாகவும், கொடுக்கப்பட்டு இருந்தால், மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $Z = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sigma \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$ என்பதில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இன்மை கருதுகோள்

(அ) $H_0 : \mu = \mu_0$ (ஆ) $H_0 : \mu_X = \mu_Y$

(இ) $H_0 : P_X = P_Y$ (ஈ) $H_0 : P = p_0$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 33 1/28/2020 5:21:23 PM