மீது படுகின்றது. எனவே பூச்சிக்கொல்லியின் எஞ்சிய நச்சு என்பது பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தெளிப்பதனாலும், அறியாத மற்றும் தவிர்க்க முடியாத மூலங்களிலிருந்து (சுற்றுச்சூழல்) பெறப்படும் எஞ்சிய நச்சுக்களின் விளைவினாலும் ஏற்படுவதாகும்.

5.8.1 அதிகபட்ச எஞ்சிய நச்சின் அளவு

பன்னாட்டு சட்ட விதிகளுக்குட்பட்டு, அதிகபட்ச எஞ்சிய நச்சின் அளவு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் கால்நடை உணவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லிகளின் எஞ்சிய நச்சின் அளவாகும். இது ppm (மிகி / கிகி) என்ற அளவில் குறிக்கப்படுகிறது.

சில பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும்பொழுது எஞ்சிய நச்சு மிகக் குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம். சில பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும் பொழுது, அவற்றின் எஞ்சிய நச்சு வாரக்கணக்கிலோ, மாதக் கணக்கிலோ, வருடக் கணக்கிலோ காணப்படும். எனவே, அதிகபட்ச எஞ்சிய நச்சின் அளவை அறிவது அவசியமாகும்.

அதிகபட்ச எஞ்சிய நச்சின் அளவு

பூச்சிக்கொல்லி / பூசணக்கொல்லி / களைக்கொல்லி	பயிர்	அதிகபட்ச அளவு மிகி / கிகி (பிபிஎம்)
டைகுளோர்வாஸ்	உணவு தானியங்கள், காய்கறிகள்	0.05 0.5
டைமீதோயேட்	பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் மிளகாய்	2.0 0.5
பைரித்திரின்கள்	உணவு தானியங்கள் காய்கறிகள், பழங்கள்	– 1.0
மோனோகுரோட்டாஃபாஸ்	உணவு தானியங்கள் ஆரஞ்சு வகை மற்ற பழங்கள் முட்டை (ஓடு நீங்கலாக) பால் மற்றும் பால்சார்ந்த பொருட்கள் இறைச்சி காஃபி	0.025 0.2 1.0 0.02 0.02 0.02 0.1
கார்பன்டசிம்	உணவு தானியங்கள் காய்கறிகள் மா வாழை	0.5 0.5 2.0 1.0
அட்ரசின்	மக்காச்சோளம், கரும்பு	0.25
கேப்டான்	காய்கறிகள், பழங்கள்	15.0
பியூட்டாக்குளோர்	நெல்	0.05
கிளைபோசேட்	தேயிலை	1.0

AGRI_Chapter 05.indd 119 1/11/2020 12:08:25 PM