

பூச்சியின் அடையாளம்

- தத்துப்பூச்சி பழுப்பு (அல்லது) கரும்பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

சேத அறிகுறிகள்

- தாக்கப்பட்ட பயிர்கள் முற்றிலும் காய்ந்து தீய்ந்தது போல் காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- தழைச்சத்து அதிகமாக இடுதலைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- பிப்ரோஃபேசின் - 800மிலி/எக்டர்
- எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட ரகங்கள் – CO 42, PY 3.

3. கதிர் நாவாய்ப் பூச்சி:
லெப்டோகோரிசா அக்யூட்டா



பூச்சியின் அடையாளம்

- மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.
- இது இருக்கும் இடத்தில் ஒரு வகை துர்நாற்றம் வீசும்.

சேத அறிகுறிகள்

- பால் பிடிக்கும் தருணத்தில் தானியங்களிலிருந்து சாற்றை உறிஞ்சுவதால் மணிகள் பதராகிவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- 10% கிள்ளிகுளம் வசம்புத்தூள் - 25கிகி/எக்டர்
- 5% வேப்பங்கொட்டை கரைசல் தெளிக்க வேண்டும்.
- மாலத்தியான் - 1.0லி/எக்டர்

II நோய்கள்

1. நெல் குலை நோய்:
மேக்னபோர்த்தே கிரைசியா

நோய் காரணி : பூசணம்



அறிகுறிகள்

- தண்டு, இலையுறை, இலை, கழுத்து, தானியம் போன்ற பாகங்களைத் தாக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
- நோய் தீவிரமடையும் பொழுது தீயினால் கருகியதுபோன்றதோற்றத்தைஏற்படுத்தும்.
- கருமைநிறப் புள்ளிகள் தோன்றி, இலை முழுவதும் பரவி, இலைகளை கருகச் செய்யும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- மாற்று ஊன்வழங்கிகளை அழிக்க வேண்டும்.

AGRI_Practical.indd 260 03-01-2020 17:42:57