- டிரைசைக்ளோசோல் 500 கி/எக்டர் அல்லது அசோசிஸ்டிரோபின் 500மிலி/எக்டர்

2. பாக்டீரியா இலைக்கருகல் நோய்: *சேந்தோமோனஸ் ஒரைசே* pv. *ஒரைசே*

நோய் காரணி : பாக்டீரியா

அறிகுறிகள்

- இலைகளின் நுனியிலிருந்து விளிம்புகளை ஒட்டி நீர்க்கசிவுடன் கூடிய இளஞ்சிவப்பு நிறக்கோடுகள் தோன்றும்.



- இலைகளில் உள்ள சாற்றுக் குழாய் தடைபடுவதால் ஊட்டச்சத்து ஓட்டம் தடைபட்டு இலைகள் கருகிவிடும். பயிரின் இளம் பருவத்தில் தோன்றும் இந்நோய்க்கு கிரிசெக் (Kresek) என்று பெயர்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்


- 20% பசுஞ்சாணக் கரைசலை இந்நோய் அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடனும், 15 நாட்கள் கழித்தும் தெளித்தல்.
- 300கி அக்ரிமைசின் + 1250 கி தாமிர ஆக்ஸிகுளோரைடு/எக்டர்.
- 3% வேப்பெண்ணெய் அல்லது 5% வேப்பங்கொட்டைக் கரைசல் தெளித்தல்.

3. நெல் செம்புள்ளி நோய்: *ஹெல்மிந்தோஸ்போரியம் ஒரைசே*

நோய் காரணி : பூசணம்

அறிகுறிகள்

- நாற்றங்கால் மற்றும் நடவு வயலில் இந்நோய் தோன்றும்.
- இலைகளில் எள் விதை போன்ற வடிவில் சிவப்பு நிறப்புள்ளிகள் தோன்றி இலை முழுவதும் பரவும்.
- நோய் தீவிரமடையும்பொழுது 50% விளைச்சல் பாதிப்பு ஏற்படும்.



கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- கார்பன்டசிம் 2கி/கிகி விதை – விதை நேர்த்தி
- மெட்டோமினோஸ்டிரோபின் - 500 மிலி/எக்டர்
- எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட இரகங்கள்: CO 20, பத்மா, IR 24, வெள்ளைப்பொன்னி

4. நெல் துங்ரோ வைரஸ் (RTV) :

நோய் காரணி : நச்சுயிரி

நோய் பரப்பி : பச்சை தத்துப்பூச்சி



அறிகுறிகள்

- பயிர் வளர்ச்சி குன்றி, தூர் எண்ணிக்கை குறைந்து காணப்படும்.
- இலைகள் மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு நிறமாக மாறிவிடும்.
- பெரும்பாலான கதிர்கள் மலட்டுத்தன்மை அடைந்து விடும்.

AGRI_Practical.indd 261 03-01-2020 17:42:57