சேத அறிகுறிகள்

- இலை மற்றும் கதிர்களை உண்டு அதிக அளவில் சேதப்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- குளோரான்ட்ரனிலிபுரோல் (Chlorantranilliprole)- 90மிலி/எக்டர்
- தயோடிகார்ப் - 500கி/எக்டர்

II நோய்கள்

1. துருநோய்: *பக்சினியா சொர்கி*

நோய் காரணி : பூசணம்




அறிகுறிகள்

- குறைவான வெப்பநிலை மற்றும் அதிக ஒப்பு ஈரப்பதம் இந்நோயின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கும்.
- இலைகளின் இருபுறங்களிலும் துரு போன்ற புள்ளிகள் தோன்றும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- ஓர் எக்டர் நிலத்தில் 2.5 கிகி டிரைக்கோடெர்மா விரிடி அல்லது சூடோமோனாஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் உயிர் பூசணக்கொல்லியை 50 கிலோ தொழுஉரத்துடன் கலந்து, நடவு செய்த 30 நாட்கள் கழித்து இட வேண்டும்.
- மாங்கோசெப் - 1.0 கிகி/எக்டர்.

2. அடிச்சாம்பல் நோய்: *பெரனோஸ்கிலிரோஸ்போரா சொர்கி*

நோய் காரணி : பூசணம்

அறிகுறிகள்

- இலைகளில் வெளிர் பச்சை நிறக் கோடுகள் தென்படுவதுடன் இரு புறமும் வெண்மை நிற பூசண வளர்ச்சி காணப்படும்.




- பயிரின் வளர்ச்சி குன்றி புதர் போல காட்சியளிக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்


- பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை சேகரித்து அழித்தல்.
- மெட்டாலாக்சில் - 1.0கிகி/எக்டர்.
- எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட இரகம் – COH 5

2.2 பயறுவகைப் பயிர்கள்

2.2.1 துவரை

I பூச்சிகள்

1. இறகுப்பூச்சி: *எக்சாலாஸ்டிஸ் அடோமோசா*




AGRI_Practical.indd 263 03-01-2020 17:42:58