பூச்சியின் அடையாளம்

- தாய்ப்பூச்சிகள் பிளவுபட்ட இறக்கைகளுடன் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- ஊசி முனை அளவு உருவம் கொண்ட முட்புழுக்கள் காய்களில் துளைகளை ஏற்படுத்தி சேதப்படுத்தும்.


கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- எக்டருக்கு 50 பறவைப் பந்தல் அமைக்கலாம்.
- 0.03% அசாடிராக்டின் (அ) *பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ்* தெளிக்கலாம்.
- எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 150கி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.

2. காய்த்துளைப்பான்:

ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா





பூச்சியின் அடையாளம்

- தாய்ப்பூச்சிகள் பழுப்பு நிறத்தில், முன்னிறக்கைகள் பசுமை கலந்த சாம்பல் நிறத்திலும், பின்னிறக்கைகள் வெண்மை நிறத்திலும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- காய்களில் வட்ட வடிவிலான துளையிட்டு தலையை மட்டும் காய்களுக்குள் செலுத்தி, கடித்து உண்டு சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- புழுக்களை கைகளால் சேகரித்து அழித்தல்.
- இன்டெக்சோகார்ப் - 330மிலி/எக்டர் (அ) ஸ்பினோசாட் - 150 மிலி/எக்டர்
- NPV – நியூக்ளியர் பாலிஹெட்ரோசிஸ் வைரஸ் 250 – 300 LE / எக்டர்.

II நோய்கள்

1. துவரை மலட்டுத் தேமல்:

நோய் காரணி : நச்சுயிரி

நோய் பரப்பி : பயிர் சிலந்தி



அறிகுறிகள்

- துவரைப் பயிரில் கணுவிடைத் தூரம் குறைந்து, வளர்ச்சி குன்றி புதர் போலக் காணப்படும்.
- இலைகள் சுருங்கி, அடர் மற்றும் வெளிர் பச்சை நிறத் திட்டுகளுடன் காணப்படும்.
- தீவிரமாக பாதிக்கப்படும்போது மலட்டுத் தன்மை உருவாகும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நோய் தாக்கிய செடிகளை அப்புறப்படுத்தி, அழிக்க வேண்டும்.

AGRI_Practical.indd 264 03-01-2020 17:42:58