- ஃபெனசாக்வின் – 1.0மிலி/லிட்டர் வீதம் தெளித்து எரியோஃபைட் சிலந்திகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

2. வாடல் நோய்: *ஃபியூசேரியம் ஊடம்*

நோய் காரணி : பூசணம்



அறிகுறிகள்

- ஆரம்பத்தில் இலைகள் வெளிறி துவண்டு காணப்படும்.
- படிப்படியாக கீழிலிருந்து மேலாக வாடி இறந்து விடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விதை நேர்த்தி: *டிரைக்கோடெர்மா விரிடி* – 4.0கி/கிகி விதை அல்லது சூடோமோனாஸ் *ஃபுளூரசன்ஸ்* – 10.0 கி/கிகி விதை
- ஓர் எக்டர் நிலத்தில் 2.5கிகி சூடோமோனாஸ் *ஃபுளூரசன்ஸ்* உயிர் பூசணக்கொல்லியை 50 கிலோ தொழுஉரத்துடன் கலந்து நடவு செய்த 30ஆம் நாள் தூவுதல்.
- கார்பன்டசிம் 1.0கி/லி என்ற அளவில் மண்ணை நனைத்தல்.

2.2.2 உளுந்து

I பூச்சிகள்

1. புள்ளிக்காய்ப் புழு: *மரூகா விட்ரேட்டா / ம.டெஸ்டுலாலிஸ்*

பூச்சியின் அடையாளம்

- தாய்ப்பூச்சிகள் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
- முன்னிறக்கைகள் அடர் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.





சேத அறிகுறிகள்

- வட்ட வடிவில் காய்களைத் துளைத்துண்டு சேதம் விளைவிக்கிறது.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- *பெவரியா பேசியானா* பூசணம் - 1கிகி/எக்டர்
- எமாமெக்டின் பென்சோயேட் - 150கி/எக்டர்
- நவ்லோரான் + இன்டக்சோகார்ப் - 750 மிலி/எக்டர்

2. முள் காய்த்துளைப்பான்: *ஈடியெல்லா ஜிங்கெனெல்லா*

பூச்சியின் அடையாளம்

- சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் முன்னிறக்கைகளின் விளிம்புகளில் வெண்மை நிறக் கோடுகள் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- பூக்கள் மற்றும் காய்கள் உதிரும்.
- காய்களில் புழுக்கள் நுழைந்த பழுப்பு நிற வடுக்கள் காணப்படும்.

AGRI_Practical.indd 265 03-01-2020 17:42:58