- குறைந்த வெப்பம் மற்றும் அதிக ஒப்பு ஈரப்பதம் நிலவும்போது நோயின் தாக்குதல் அதிகமாக காணப்படும்.
- நோயின் தீவிரம் அதிகமாகும்போது பயிர் காய்ந்து மடிந்து விடும்.



கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விதை நேர்த்தி: கார்பன்டசிம் - 2.0கி/கிகி விதை.
- நோய் பாதிக்கப்பட்டு உதிர்ந்த பயிர் பாகங்களை சேகரித்து அழிக்க வேண்டும்.
- மாங்கோசெப் - 1.0கிகி/எக்டர்.

2.3 எண்ணெய்வித்துப் பயிர்கள்

2.3.1 நிலக்கடலை

1. சிவப்புக் கம்பளிப் புழு: *அம்சாக்டா ஆல்பிஸ்ட்ரைகா*





பூச்சியின் அடையாளம்

- அந்துப்பூச்சியின் முன்னிறக்கையில் பழுப்பு நிறக் கோடுகளும், பின்னிறக்கையில் பழுப்பு நிறப் புள்ளிகளும் காணப்படும்.
- புழுக்கள் சிவப்பு நிற உரோமங்களுடன் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- தண்டுப்பகுதி மற்றும் இலைக்காம்புப் பகுதி தவிர அனைத்து பாகங்களையும் உண்டு சேதம் ஏற்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- கோடை உழவு, விளக்குப்பொறி, இனக்கவர்ச்சிப்பொறி மூலம் கூட்டுப்புழு மற்றும் தாய்ப்பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
- வயலைச் சுற்றி 30 செமீ ஆழம் கொண்ட அகழிகள் ஏற்படுத்தி புழுக்களின் நடமாட்டத்தைத் தடுக்கலாம்.
- தட்டைப்பயறு, துவரை போன்ற பயிர்களை ஊடுபயிராகப் பயிரிடலாம்.
- தயோடிகார்ப் – 500 கி/எக்டர் தெளிக்க வேண்டும்.
- NPV – 250–300 LE/எக்டர் தெளிக்கவேண்டும்.

2. சுருள் பூச்சி: *அப்ரோரிமா மோடிசெல்லா*







AGRI_Practical.indd 267 03-01-2020 17:42:59