பூச்சியின் அடையாளம்

- அந்துப்பூச்சி பழுப்பு நிற இறக்கைகளுடன், முன்னிறக்கையில் வெண்மை நிறப் புள்ளிகளுடன் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- புழுக்கள் இலைகளைக் குடைந்து பச்சையத்தைச் சுரண்டி தின்னும்.
- பூச்சித்தாக்குதல் அதிகரிக்கும்பொழுது, கருகல் நோய் தாக்கியதைப் போன்று தோற்றமளிக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விளக்குப்பொறி – 12 / எக்டர் நிறுவ வேண்டும்.
- டைமீத்தோயேட் – 1.0 லி/எக்டர்
- குயினால்ஃபாஸ் - 1.0 லி/எக்டர்

3. காய்த்துளைப்பான்:

அனிசோலேபிஸ் ஸ்டாலி /யூபோரெலியா ஸ்டாலி



பூச்சியின் அடையாளம்

- பழுப்பு நிற பூச்சிகளின் வால் பகுதியில் கிடுக்கி போன்ற கொம்புகள் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- துளையிடப்பட்ட காய்களில் விதைகளின்றி கழிவுகள் நிரம்பி காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விதைப்பதற்கு 40 நாட்களுக்கு முன்பாக கார்போஃபியூரான் 3% G – 50 கிகி/எக்டர் அல்லது குளோர்பைரிஃபாஸ் 50 EC – 5லி/எக்டர் மண்ணில் இடுதல்.
- மாலத்தியான் 5% D – 25 கிகி/எக்டர்.
- கடைசி உழவின் போது வேப்பம் பிண்ணாக்கு இட்டு உழுதல்.

II நோய்கள்

1. டிக்கா இலைப்புள்ளி நோய்

முன்பருவம்:

செர்க்கோஸ்போரா அராகிடிகோலா

பின்பருவம்:

ஃபெய்சாரியாப்சிஸ் பெர்சனேட்டா

நோய் காரணி : பூசணம்



அறிகுறிகள்

- முன்பருவ இலைப்புள்ளி நோய் நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகும், பின்பருவ இலைப்புள்ளி நோய் நடவு செய்த 55 நாட்களுக்குப் பிறகும் தோன்றும்.
- புள்ளிகள் ஆரம்பத்தில் மஞ்சள் நிறமாகத் தோன்றி, பின்னர் வட்ட வடிவில் கருமையாகிவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- கம்பு, சோளம் ஊடு பயிரிடுதல் (1:3)
- 10% எருக்கு இலைச் சாறு தெளித்தல்.
- குளோரோதலோனில் 1.0 கிகி/எக்டர் தெளித்தல்.

2. துரு நோய்: *பக்சினியா அராகிடிஸ்*

நோய் காரணி: பூசணம்



AGRI_Practical.indd 268 03-01-2020 17:42:59