அறிகுறிகள்

- இலைகளின் இரு புறங்களிலும் துரு போன்ற பழுப்பு நிறப் புள்ளிகள் தோன்றும். நோய் தீவிரமாகும்போது, பூக்கள் தவிர ஏனைய பாகங்களுக்கு பரவி, இலைகள் உதிராமல் கரிந்து மடிந்துவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விதை நேர்த்தி – கார்பன்டசிம் 2.0 கி/கிகி விதை
- மாங்கோசெப் 1.0 கிகி அல்லது நனையும் கந்தகம் – 2.5 கிகி/எக்டர் தெளித்தல்

3. மொட்டுக் கருகல்:

நோய்க் காரணி: *நச்சுயிரி*

நோய் பரப்பி: இலைப்பேன்



அறிகுறிகள்

- இளம் தளிர்களில் அடர் மற்றும் வெளிர் பச்சை நிறக்கோடுகள் தோன்றும்.
- வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்பொழுது நோய் தீவிரமடையும். கணுவிடைத் தூரம் குறைந்து, வளர்ச்சி குன்றி, பக்கவாட்டு வளர்ச்சி காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நெருக்கு நடவாக (15×15 செமீ) பராமரித்தல்
- சோளம் அல்லது தென்னை இலைக் கரைசல் தெளித்தல்.
- இமிடாகுளோப்ரிட் – 100 மிலி/எக்டர் அல்லது தயோமிதாக்ஸம் WG – 100 கி/ எக்டர் தெளித்தல்.

சோளம்/தென்னை இலைக் கரைசல் தயாரித்தல்

சோளம் / தென்னை இலைகளை சேகரித்து, உலர்த்தி 1.0 கிகி அளவிற்கு பொடியாக்க வேண்டும். அதனுடன் இரண்டு லிட்டர் நீர் சேர்த்து, 60^0C வெப்பநிலையில் ஒரு மணி நேரம் வெப்பப்படுத்த வேண்டும். இக்கரைசலை மஸ்லின் துணி கொண்டு வடிகட்டி, இதனுடன் 10 லி நீர் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். ஓர் எக்டர் நிலத்தில் தெளிப்பதற்கு 500 லிட்டர் கரைசல் தேவை.

2.3.2 தென்னை

I பூச்சிகள்

1. காண்டாமிருக வண்டு:

ஒரிக்டஸ் ரைனோசரஸ்

பூச்சியின் அடையாளம்

- வண்டுகள் பழுப்பு கலந்த கருப்பு நிறத்தில் தலையில் கொம்புடன் காணப்படும்.
- புழுக்கள் தடித்து, தட்டையாக, பழுப்பு நிறத் தலையுடன் 'C' வடிவில் எருக்குழிகளில் காணப்படும்.





AGRI_Practical.indd 269 03-01-2020 17:43:00