கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பாதிக்கப்பட்ட மரங்களை வெட்டி எரித்துவிட வேண்டும்.
- சூடோமோனோஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் – 200கி + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி – 200கி / மரம்/வருடம் இட வேண்டும்.
- மரத்திற்கு டிரைடிமார்ஃப் – 2.0மிலி அல்லது ஹெக்சகோனசோல் – 1.0 மிலி (100 மிலி நீரில் கலந்து) வேர் மூலம் செலுத்தலாம்.

2. இலைக்கருகல் நோய்: *லேசியோடிப்லோடியா தியோப்ரோமே*

நோய் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- நாற்று மற்றும் நெற்றுகளை பெருமளவில் பாதிக்கும் இந்நோய் இலைகளின் நுனிபாகத்தில் தொடங்கி, அடிப்பாகம் வரை பரவும்.
- இலைகள் பழுப்பு நிறமாக மாறுவதுடன், நெற்றுகள் சுருங்கி, உருமாற்றம் அடையும்.
- நோய் தீவிரமாகும்போது காய்கள் அழுகிவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பாதிக்கப்பட்ட இலைகளை சேகரித்து எரித்து விட வேண்டும்.
- ஒரு மரத்திற்கு சூடோமோனாஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் 200கி பூசணத்தை 5.0 கிகி வேப்பம் பிண்ணாக்கு மற்றும் 50கிகி தொழுஉரத்தை சேர்த்து, வருடத்திற்கு ஒருமுறை இட்டு இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- 0.25% தாமிர ஆக்ஸிகுளோரைடு அல்லது ஹெக்சகோனசோல் – 3.0 மிலி அல்லது டபுக்கோனசோல் – 3.0 மிலி மருந்தை 100 மிலி நீரில் கலந்து மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை என மூன்று முறை வேர் மூலம் செலுத்தலாம்.

2.4 பணப்பயிர்கள்

2.4.1 கரும்பு

I பூச்சிகள்

1. இளங் குருத்துப் புழு: *கைலோ இன்பஸ்கேட்டல்லஸ்*





பூச்சியின் அடையாளம்

- அந்துப்பூச்சிகளின் முன்னிறக்கை பழுப்பு நிறமாகவும், பின் இறக்கை வெண்மை நிறமாகவும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இப்பூச்சியின் புழுக்கள் குருத்துப் பகுதியை துளைத்து சேதப்படுத்துவதால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும்.

AGRI_Practical.indd 272 03-01-2020 17:43:02