### பூச்சி அடையாளம்

- அந்துப்பூச்சிகள் வெண்மை நிறத்துடனும், வயிற்றுப் பகுதியின் இறுதியில் ஆரஞ்சு கலந்த பழுப்பு நிற அடர்த்தியான ரோமங்களைக் கொண்டும் காணப்படும்.

### சேத அறிகுறிகள்

- குருத்துப்பகுதியில் நுழைந்து, தண்டைக் குடைவதால் குருத்தழிவு ஏற்படும்.

### கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- *ஐசோட்டிமா ஜாவன்ஸிஸ்* – 100 ஜோடிகள் ஏவலாம்.
- நொவலூரான் + எமாமெக்டின் பென்சோயேட் சேர்ந்த மருந்தை 1.5லி/எக்டர் தெளிக்க வேண்டும்.

## 4. தோகை தத்துப்பூச்சி: *பைரில்லா பெர்புசில்லா*



### பூச்சியின் அடையாளம்

- இப்பூச்சிகள் வைக்கோல் நிறத்திலும், தலையின் முன்பகுதி அலகு போல் நீண்டும், இறக்கைகள் ஒளிபுகக் கூடியவையாகவும், பெண் பூச்சிகள் வயிற்றுப் பகுதியில் கொத்து உரோமங்களுடனும் காணப்படும்.

### சேத அறிகுறிகள்

- கூட்டமாக அமர்ந்து சாற்றை உறிஞ்சுவதால், தோகைகள் மஞ்சள் நிறமாகிவிடும்.
- இலைகளில் ஏற்படும் பிசுபிசுப்புத் தன்மையினால், கரும்படல நோய் ஏற்படும்.

### கட்டுப்பாட்டு முறைகள்


- தழைச்சத்து அதிகம் இடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- ஒட்டுப்பசைப் பொறி பயன்படுத்த வேண்டும்.
- ∴ பெப்ரோனில் + இமிடாகுளோப்ரிட் சேர்ந்த கலவை மருந்தை 100கி/எக்டர் தெளிக்க வேண்டும்.

## II நோய்கள்

## 1. செவ்வழுகல் நோய்: *குளோமெரெல்லா டுகுமானென்சிஸ்*

நோய் காரணி: பூசணம்





### அறிகுறிகள்

- இலைகளின் அடிபாகத்திலிருந்து நுனிபாகம் நோக்கி பரவும் இந்நோயினால், இலைகள் ஆரஞ்சு/மஞ்சள் நிறமாக மாற்றமடையும்.
- இலைகளின் மைய நரம்பு மற்றும் தண்டுப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டு, சர்க்கரைச் சத்தின் அளவு குறைந்து, சிவப்பு நிறமாகி, புளித்த வாடை வீசும்.

### கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நோயினால் பாதிக்கப்படாத தோட்டத்திலிருந்து கரணைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- கரணை நேர்த்தி – கார்பன்டசிம் 1.0 கி/லி நீர்.
- எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட இரகங்களைப் (CO 86032, COSi 95071, COG 93076, COC 22, COSi 6, COG 5) பயிரிட வேண்டும்.
- கட்டைப்பயிர் சாகுபடியை தவிர்க்க வேண்டும்



AGRI_Practical.indd 274 03-01-2020 17:43:03