2. கரிப்பூட்டை நோய்:
அஸ்டிலேகோ சிட்டாமினியே

நோய் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- கருமை நிற பூசண வித்துகள் அடங்கிய உறையினால் சூழப்பட்ட சாட்டை போன்ற அமைப்பு (150 செமீ நீளம் வரை) கரும்பின் நுனிப்பகுதியிலிருந்து வரும். இதனால் **சாட்டை நோய்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- எதிர்ப்புத்திறன் கொண்ட இரகங்களைப் (CO 86249, COG 93076, COC 22, COSi 6 மற்றும் COG 5) பயிரிட வேண்டும்.
- கட்டைப்பயிர் சாகுபடியின் போது துவரைப் பயிரை ஊடுபயிராகப் பயிரிட்டு, இந்நோய் பரவுதலைத் தடுக்கலாம்.
- விதைக் கரணைகளை 50^0C வெப்பநிலையில் ஒரு மணிநேரம் நீராவி சிகிச்சை செய்யலாம்; அல்லது 50^0C வெந்நீரில் 30 நிமிடம் அமிழ்த்தி அல்லது 52^0C வெந்நீரில் 18 நிமிடம் அமிழ்த்தி கரணை நேர்த்தி செய்யலாம்.
- கருஞ்சாட்டைகளை சேகரித்து அழிக்க வேண்டும்.
- கரணை நேர்த்தி – கார்பன்டசிம் / டிரைடிமிஃபான் – 1.0கி/லி நீரில் பத்து நிமிடங்கள் ஊற வைக்க வேண்டும்.

3. கரும்பு புல்தண்டு நோய்

நோய்க் காரணி: ஃபைட்டோபிளாஸ்மா

நோய் பரப்பி: அசுவினி



அறிகுறிகள்

- நடவு செய்த மூன்று மாதங்களில் பயிர் பாதிக்கத் தொடங்குகிறது.
- பயிர்கள் மஞ்சள் நிறமாகி, வளர்ச்சி குன்றி புதர் போல காட்சியளிக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட இரகங்களை (CO 86249, COG 93076, COC 22) பயிர் செய்ய வேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்ட தூர்களை அகற்றிவிட்டு, புதிய நாற்றுகளை நட வேண்டும்.
- கரணைகளை நீராவி சிகிச்சை அல்லது, வெப்பக்காற்று சிகிச்சை (54^0C – 8 மணி நேரம்) செய்ய வேண்டும்.
- இந்நோய் பரப்பும் அசுவினிப் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த டைமீதோயேட் 1.0லி/ எக்டர் அல்லது இமிடாகுளோப்ரிட் 100மிலி/ எக்டர் தெளிக்க வேண்டும்.

2.4.2 பருத்தி

I பூச்சிகள்

1. வெள்ளை ஈ: *பெமிசியா டபாசி*

பூச்சியின் அடையாளம்

- இளம்பூச்சி பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.
- வளர்ச்சியடைந்த பூச்சி, மிகச் சிறிதாக, மஞ்சள் நிற உடலுடன், வெள்ளை நிற மெழுகுப் படலத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

AGRI_Practical.indd 275 03-01-2020 17:43:03