



சேத அறிகுறிகள்

- இலைகளில் பச்சையம் இழந்த புள்ளிகள் தோன்றி, பின் திசுக்கள் மஞ்சளாக மாறும்.
- இப்பூச்சி இலைச்சுருள் நச்சுயிரி நோயைப் பரப்பும் காரணியாக உள்ளது.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பொறி – 12/எக்டர் வைக்கலாம்.
- அசிட்டமோபிரிட் – 100கி/எக்டர் மருந்தினைத் தெளிக்கலாம்.
- பயிர் சுழற்சி செய்ய வேண்டும்.
- அஃபிடோபைரோபென் 1.0 லி/எக்டர்

2. பச்சை தத்துப்பூச்சி:
அம்ராஸ்கா பிகுட்டுலா பிகுட்டுலா

பூச்சியின் அடையாளம்

- இளம் பூச்சிகள் இளம்பச்சை நிறத்தில் இறக்கைகளற்று இலைகளின் அடிப்புறத்தில் காணப்படும்.
- வளர்ச்சியடைந்த பூச்சிகள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படும்.





சேத அறிகுறிகள்

- இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி, இலை விளிம்புகள் அடிப்புறமாக சுருளும்.
- தாக்குதல் அதிகமாகும்போது இலைகள் செந்நிறமாக மாறும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- இமிடாகுளோப்ரிட் – 100 மிலி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.
- 3.0% வேப்பெண்ணெய் கரைசலை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் மூன்று முறை தெளிக்கலாம்.

3. பருத்தி தண்டுக் கூன் வண்டு:
பெம்ஃபெருலஸ் அஃபினிஸ்

பூச்சியின் அடையாளம்

- புழு கால்களற்றும், வண்டு சிறியதாக, கருமை நிறத்திலும் காணப்படும். வண்டின் உடலின் மேற்புறத்தில் வெள்ளை நிறத் திட்டுகள் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- நில மட்டத்திற்கு மேல் உள்ள தண்டுப்பகுதியில் முடிச்சுகள் காணப்படும்.

AGRI_Practical.indd 276 03-01-2020 17:43:03