3. வெர்டிசிலியம் வாடல் நோய்: *வெர்டிசிலியம் டாலியே*





நோய்க் காரணி: பூசணம்

அறிகுறிகள்

- பொதுவாக இந்நோய் காய் பிடிக்கும் தருணத்தில் அதிகமாகக் காணப்படும்.
- நரம்பிடைப் பகுதி வெளுத்து மஞ்சளாகும்; இலை ஓரங்கள் காய்ந்து விடும்.
- நரம்புகளின் ஓரங்கள் பசுமையாகவும், மற்ற பகுதிகள் பழுப்பு நிறமாகவும், குவிந்தும் காணப்படுவது 'புலியின் கால் தடம்' போன்று காணப்படும்.
- செடியின் மேல்பட்டையை நீக்கி அல்லது பிளந்து பார்த்தால் இளஞ்சிவப்பு நிறக்கோடுகள் காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- குதிரைமசால்/நெல்/சாமந்தி கொண்டு 2-3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பயிர் சுழற்சி செய்ய வேண்டும்.
- சாம்பல் சத்து உரத்தின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும்.
- 0.1% கார்பன்டசிம் கொண்டு செடிகளின் கழுத்துப் பகுதியை நனைக்க வேண்டும்.

4. சாம்பல் (அ) தயிர்ப் புள்ளி நோய்: *ராமுலேரியா எரியோலா*

நோய்க் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- இலையின் அடிப்புறத்தில் ஒழுங்கற்ற, கசியும் புண்களும், இலையின் மேற்புறத்தில் சாம்பல் நிறப் புள்ளிகளும் காணப்படும்.
- நோய் தீவிரமாகும்போது சாம்பல் நிற நுண்துகள்கள் இலையின் மேற்பரப்பில் காணப்படும்.
- இலைகள் நுனியிலிருந்து உள்நோக்கி காயத் தொடங்கி, மஞ்சள் நிறமாகி, பின் உதிர்ந்துவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பாதிக்கப்பட்ட தாவர பாகங்களை அகற்றி தீயிலிட்டு எரிக்க வேண்டும்.
- அதிகமாக தழைச்சத்து உரங்களை இடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- கார்பன்டசிம் – 250 கி/எக்டர் (அ) 1.25 – 2.0 கிகி/எக்டர் நனையும் கந்தகத் தூளை வாரம் ஒருமுறை தெளிக்க வேண்டும்.

2.4.3 மஞ்சள்

I பூச்சிகள்

1.இலைப்பேன்: *பேன்கீட்டோதிரிப்ஸ் இண்டிகஸ்*

பூச்சியின் அடையாளம்

- பூச்சிகள் மிக நுண்ணியவையாக, கரும்பழுப்பு நிறத்தில், இறக்கைகள் சீப்பு போல் பிளவு பட்டு காணப்படும்.

AGRI_Practical.indd 279 03-01-2020 17:43:04