

சேத அறிகுறிகள்

- பூச்சிகள் கூட்டமாக அமர்ந்து சாற்றை உறிஞ்சுவதால், இலைகள் சுருண்டும், நெளிந்தும், கரிந்தும் காணப்படும்.
- பச்சையம் இழந்து தீயில் கருகியது போன்று தோற்றமளிக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- இமிடாகுளோப்ரிட்-100 மிலி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.
- கார்போசல்ஃபான்-500 மிலி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.

2. தண்டு துளைப்பான்: *கோனோகெத்தஸ் பங்டிஃபெராலிஸ்*





பூச்சியின் அடையாளம்

- தாய் அந்துப்பூச்சிகள் மஞ்சள் நிற இறக்கைகளில் கருமை நிறத் திட்டுகளுடன் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- புழுக்கள் குருத்துப் பகுதியை குடைந்து சேதப்படுத்துவதால் குருத்தழிவு ஏற்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- விளக்குப் பொறிகள் வைத்து அந்துப் பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
- மோனோகுரோட்டோஃபாஸ் 1.0லி/எக்டர் தெளித்து புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

II நோய்கள்

1. மஞ்சள் கிழங்கு அழுகல்: *பித்தியம் அஃபானிடெர்மேட்டம்*

நோய்க் காரணி: பூசணம்





அறிகுறிகள்

- வேர் வளர்ச்சி குன்றி, பயிரின் அடி பாகம் நீர்க்கசிவுடன், மென்மையாக இருக்கும்.
- கிழங்குகள் அழுகி, பழுப்பு நிறமடையும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நோய் பாதிப்பற்ற கிழங்குகளை தேர்வு செய்து விதைக்க வேண்டும்.
- போதிய வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- 0.3% சினெப் அல்லது 0.3% தாமிர ஆக்ஸிகுளோரைடு கொண்டு கிழங்கு நேர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- ஓர் எக்டருக்கு 2.5கிகி சூடோமோனாஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் உயிர் பூசணக்கொல்லியை தொழுஉரத்துடன் கலந்து வயலில் இடலாம்.

2. இலைப்புள்ளி நோய்: *கொலிட்டோடிரிக்கம் காப்சிசி*

நோய்க் காரணி: பூசணம்



AGRI_Practical.indd 280 03-01-2020 17:43:04