10. _____ நிறங்கள் பயிர் வளர்ச்சியில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன.
(அ) நீலம் மற்றும் சிவப்பு
(ஆ) நீலம் மற்றும் மஞ்சள்
(இ) சிவப்பு மற்றும் பச்சை
(ஈ) பச்சை மற்றும் மஞ்சள்

11. வெங்காயத்தில் குமிழ் உருவாக _____ நேரம் அவசியம்.
(அ) குறைந்த பகல்
(ஆ) நீண்ட பகல்
(இ) நீண்ட இரவு
(ஈ) நடுநிலை பகல்

12. பூசணிக் குடும்பப் பயிர்களில் பெண் பூக்களின் உருவாக்கத்தை _____வெப்பநிலையும், _____ பகல் பொழுதும் துரிதப்படுத்துகின்றன.
(அ) குறைந்த, குறைந்த
(ஆ) நீண்ட, நீண்ட
(இ) குறைந்த, நீண்ட
(ஈ) நீண்ட, குறைந்த பகல்

13. கிழங்கு வகைப் பயிர்களுக்கு _____ மண் ஏற்றது.
(அ) வண்டல்
(ஆ) களிமண்
(இ) செம்மண்
(ஈ) மணற்சாரி

14. பயிர் வளர்ச்சிக்கு _____ நிலை ஏற்றது.
(அ) அமில
(ஆ) கார
(இ) நடுநிலை
(ஈ) உவர்

15. _____ % பயிர் விளைச்சலை தரமான விதைப்பொருளே நிர்ணயிக்கிறது.
(அ) 30–40 (ஆ) 20–30
(இ) 10–20 (ஈ) 20–25

16. உகந்த பயிர் எண்ணிக்கையை விட வயலில் உள்ள பயிர் எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருந்தால் பயிர் மகசூல் _____
(அ) அதிகரிக்கும்
(ஆ) குறையும்
(இ) மிக அதிகமாக இருக்கும்
(ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

17. சூரிய ஒளியின் அடர்த்தி _____ பொருத்து மாறுபடும்.
(அ) கட்டிடத்தின் ஜன்னல் அமைப்பு
(ஆ) மரங்கள்
(இ) கண்ணாடியின் தூய்மை, நிறம்
(ஈ) இவை அனைத்தும்

18. ஒளியின் கால அளவிற்கு ஏற்ப தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு _____ என்று பெயர்.
(அ) ஒளி அடர்த்தி
(ஆ) ஒளி காலத்துவம்
(இ) ஒளியின் அலைநீளம்
(ஈ) ஒளியின் தரம்

19. கட்புலனாகும் நிறமாலை _____ நிறங்களை உள்ளடக்கியது.
(அ) 2 (ஆ) 3
(இ) 6 (ஈ) 7

20. ஒளியின் அலைநீளத்தை அளவிட _____ பயன்படுகிறது.
(அ) அனிமோமீட்டர்
(ஆ) பேரோமீட்டர்
(இ) லாக்டோ மீட்டர்
(ஈ) பைரனோமீட்டர்

21. உருளைக்கிழங்கில் கிழங்கு உருவாக _____ நேரம் அவசியம்.
(அ) நீண்ட பகல்
(ஆ) நடுநிலையான பகல்
(இ) குறைந்த பகல்
(ஈ) குறைந்த இரவு

AGRI_Chapter 01.indd 21 1/2/2020 4:30:47 PM