பூச்சியின் அடையாளம்

- புழுக்கள் வெண்ணிறமாகவும், கால்களற்றும் காணப்படும்; 12.0 மிமீ நீளமுடையவை.
- உடலின் நடுப்பகுதி தடித்த, இளம் கூன்வண்டுகள் செம்பழுப்பு நிறத்திலும், வளர்ந்த கூன்வண்டுகள் கருமையாகவும் இருக்கும். இவற்றின் வாய்ப்பகுதி நீண்டு வளைந்திருக்கும்.


சேத அறிகுறிகள்

- ரொபஸ்டா, கற்பூரவள்ளி, நேந்திரன் இரகங்களை அதிகம் தாக்குகின்றன.
- தாய் வண்டு வாழைக்கிழங்கின் கழுத்துப்பகுதியில் உள்ள இலையுறையில் துளையிட்டு முட்டைகளை இடும். முட்டையில் இருந்து வெளிவரும் புழுக்கள் கிழங்கினைக் குடைந்து உட்சென்று திசுக்களை உண்ணும். அதனால் மரத்தினுள் நீண்ட சுரங்கம் காணப்படும்.
- இலைகள் வாடி, மரம் இறந்து விடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பூச்சிக்கு எதிர்ப்புத்திறனுள்ள பூவன், கதலி, பூங்கதலி போன்ற இரகங்களை பயிர் செய்ய வேண்டும்.
- ஆரோக்கியமான, பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத கன்றுகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
- பயிர் சுழற்சி செய்ய வேண்டும்.
- 60-100கி வேப்பங்கொட்டைப்பொடி அல்லது வேப்பம் பிண்ணாக்கினை கிழங்குகளை நடும்போதும், பின்னர் நான்கு மாதங்கள் கழித்து ஒரு முறையும் இடலாம்.
- ஓர் எக்டருக்கு ஐந்து இனக்கவர்ச்சிப்பொறிகளை வைத்து கவர்ந்தழிக்கலாம்(காஸ்மோலியூர்).
- வாழைத்தண்டை வெட்டிப்போட்டு வண்டுகளைக் கவர்ந்தழிக்கலாம்.
- ஃபிப்ரோனில் 500 மிலி/எக்டர் அல்லது மோனோகுரோட்டோஃபாஸ் 1லி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.

2. கண்ணாடி இறக்கைப் பூச்சி: *ஸ்டெஃபனைட்டிஸ் டிபிகஸ்*



பூச்சியின் அடையாளம்

- இளம்பூச்சிகள் மஞ்சள் நிறமாகவும், வளர்ந்த பூச்சிகள் பசுமை கலந்த வெள்ளை நிறத்தில் கண்ணாடி போன்ற இறக்கைகளுடனும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இலைகளின் கீழ்ப்புறத்தில் கூட்டமாக இருந்து கொண்டு சாற்றை உறிஞ்சுவதால், இலைகளின் மேற்புறத்தில் வெண்மையான சிறு புள்ளிகள் காணப்படும்.
- மரம் வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- தாக்கப்பட்ட இலைகளை அப்புறப்படுத்தி அழித்துவிட வேண்டும்.
- ஓர் எக்டருக்கு 15 மஞ்சள் வண்ண ஒட்டுப்பொறி வைக்கலாம்.
- டைமெத்தோயேட் 30EC - 850 மிலி/எக்டர் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

II நோய்கள்

1 வாழை முடிக்கொத்து நோய்

நோய்க் காரணி: நச்சுயிரி /வைரஸ்

நோய் பரப்பி: அசுவினி



AGRI_Practical.indd 300 03-01-2020 17:43:13