இந்நோய் சிகடோகா இலைப்புள்ளி நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அறிகுறிகள்

- இலையின் மேற்புறத்தில் இள மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிறக் கோடுகள் நரம்புகளுக்கு இடையே தோன்றும்.
- பின்னர் இவை நீள்வட்ட பழுப்பு நிறப் புள்ளிகளாக மாறும். இப்புள்ளிகளின் மையப்பகுதி சாம்பல் நிறத்திலும், புள்ளியைச் சுற்றி மஞ்சள் நிற (Halo) குழிப்பகுதியும் தோன்றும்.
- நோய் தீவிரமடையும்போது இப்புள்ளிகள் இணைந்து கருகும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- நோய் தாக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்றி அழிக்க வேண்டும்.
- வயலை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
- சரியான வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- 1.0% போர்டோ கலவையை, 2.0% ஆளிவித்து எண்ணெயோடு சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும்.
- நோயின் ஆரம்ப அறிகுறியைக் கண்டவுடன் 600மிலி/எக்டர் அசோசிஸ்ட்ரோமின் + டெபுகொனசோல் மருந்தை 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் மூன்று முறை தெளிக்க வேண்டும்.

7.3 மலர்ப்பயிர்கள்

7.3.1 மல்லிகை

I பூச்சிகள்

1. மல்லிகை மொக்கு துளைப்பான்: *ஹென்டிகேசிஸ் டியூப்ளிஃபேசியாலிஸ்*







பூச்சியின் அடையாளம்

- அந்துப்பூச்சிகள் வெண்மை நிறமாகவும், வயிற்றுப் பகுதியில் மூன்று கருமை நிறக் கோடுகளுடனும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- புழுக்கள் விரியாத பூ மொக்குகளைத் துளைத்து உண்டு சேதம் விளைவிக்கும்.
- பூங்கொத்திலுள்ள பூக்களை பிணைத்து, உள்ளிருந்து சேதம் ஏற்படுத்தும்.
- பாதிக்கப்பட்ட பூ மொக்குகள் ஊதா நிறத்தில் மாறிவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- ஹெலிலியூர் இனக்கவர்ச்சிப்பொறி பயன்படுத்தி அந்துப்பூச்சிகளைக் கவர்ந்து அளிக்கலாம்.
- *பேசில்லஸ் துரிஞ்சியென்சிஸ்* 2.0 கி/லி நீர் தெளித்தும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- தயோகுளோபிரிட் 2.0 மிலி/லி நீர் அல்லது ஸ்பினோசாட் 0.5 மிலி/லி நீர் தெளித்தும் கட்டுப்படுத்தலாம்.

2. எரியோபிட் சிலந்தி: *ஏசெரியா ஜாஸ்மினி*

பூச்சியின் அடையாளம்

- மிக நுண்ணிய பூச்சியான இது உடல் நீண்டு, புழு போல் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இச்சிலந்திகள் இலை, குருத்துப் பகுதி, பூ மொட்டுகளைத் தாக்கும்.
- இவை சாற்றை உறிஞ்சுவதால் இலை சுருங்கி, வளர்ச்சி குன்றி காணப்படும்.
- பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் கம்பளி போன்ற வெண்மை நிற ரோம வளர்ச்சி காணப்படும்.

AGRI_Practical.indd 302 03-01-2020 17:43:13