கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட இரகங்கள் – சந்திரிகா, பெங்களூர் லோக்கல் யெல்லோ டபுள், M7, பங்கஜ் மற்றும் யெல்லோ ஸ்டார்.
- மஞ்சள் மற்றும் நீல நிற ஒட்டுப்பொறியைப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஸ்பினோசாட் 0.5மிலி/லி நீர் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

II நோய்கள்

1. இலைப்புள்ளி நோய்:

செப்டோரியா க்ரைசாந்திமெல்லா

நோய்க் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- மழைக்காலங்களில் வேகமாக பரவும் இந்நோய் தண்டு மற்றும் பூக்களில் பாதிப்புகளை உண்டாக்கி அழுகலை ஏற்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பாதிக்கப்பட்டு, உதிர்ந்த பயிர் பாகங்களை சேகரித்து அழிக்க வேண்டும்.
- அளவான நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.
- கேப்டான் + டெபுகொனசோல் அல்லது அசோசிஸ்ட்ரோபின் + டெபுகொனசோல் தயார் நிலை மருந்துகளை 2.0 மிலி/லி நீர் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

2. சாம்பல் நோய்: *ஆய்டியம் க்ரைசாந்தமி*

நோய்க் காரணி: பூசணம்

அறிகுறிகள்



- வெப்பநிலை குறைந்த மழைக்காலங்களில் இந்நோய் அதிகம் பாதிக்கிறது.
- இலைகளின் இருபுறங்களிலும் வெண்மை நிற பூசண வளர்ச்சி ஏற்பட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- சரியான பயிர் இடைவெளி பராமரிக்க வேண்டும்.
- அசோசிஸ்டிரோபின் 1.0மிலி/லி நீர் தெளித்துக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

7.4 மலைத்தோட்டப் பயிர்கள்

7.4.1 தேயிலை

I பூச்சிகள்

1. தேயிலைக் கொசு:

ஹெலோபெல்டிஸ் தீவோரா



பூச்சியின் அடையாளம்

- தாய் பூச்சி கருமையாக மார்புப்பகுதி சிவப்பு நிறத்திலும், வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை மற்றும் கருமை நிறத்திலும், பசுமை கலந்த பழுப்பு நிற இறக்கைகள் உடையதாகவும் இருக்கும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இலை, இளந்தளிர் பாகங்களில் சாற்றை உறிஞ்சும். இதனால் துவாரங்கள் ஏற்படுவதுடன் இலைகள் மேல் நோக்கி வளைந்து காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- முட்டை ஒட்டுண்ணியான *எரித்மெலஸ் ஹெலோபெல்டிடிஸ்* பயன்படுத்தலாம்.
- தயாமீதாக்ஸம் – 100கி/எக்டர் அல்லது பைஃபென்திரின் – 500 மிலி/எக்டர் அல்லது ஃபென்தியான் – 250மிலி/எக்டர் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

AGRI_Practical.indd 304 03-01-2020 17:43:14