2. சிவப்பு சிலந்தி:
ஒலிகோனைகஸ் காஃபியே




பூச்சியின் அடையாளம்

- பெண் சிலந்தி நீள் வட்டமாகவும், முன்பகுதி சிவப்பு நிறத்திலும், பின்பகுதி ஊதா நிறத்திலும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- சிலந்திகள் முதிர்ந்த இலைகளைத் தாக்கும். முதிர்ந்த இலைகளின் மேற்பரப்பில் நடுநரம்பில் தொடங்கி, பின் முழு இலைப் பரப்பையும் பாதிக்கும்.
- தாக்கப்பட்ட இலைகள் செம்பு நிறமாகி, காய்ந்து, நெளிந்து காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- 0.3% அசாடிராக்டின் தெளிக்கலாம்.
- அபாமெக்டின் – 0.5 மிலி/லி நீர் அல்லது ஸ்பைரோமெசிஃபென் – 400மிலி/எக்டர் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

II நோய்கள்

1. கொப்புளக் கருகல் நோய்:
எக்ஸோபெசிடியம் வெக்சன்ஸ்

நோய்க் காரணி: பூசணம்

அறிகுறிகள்

- ஊசித்துளை அளவான பழுப்புநிற ஒளி ஊடுருவும் புள்ளிகள் இளந்தளிர்களில் தோன்றும். பிறகு இலையின் பின்புறத்தில், பழுப்பு நிறத்தில் கொப்புளங்கள் தோன்றும். இதனால் கிளைகளோ முழுச் செடியோ இறக்க நேரிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பாதிக்கப்பட்ட கிளைகளை கவாத்து செய்தலின் போது அகற்ற வேண்டும்.
- 1.0% போர்டோ கலவை தெளிக்கலாம்.
- காப்பர் ஹைட்ராக்ஸைடு - 500 கி
- டிரைடிமார்ஃப் – 550 மிலி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.



3. பாசி இலைப்புள்ளி:
செஃபலூரஸ் வைரசன்ஸ்

நோய்க் காரணி: பாசி



அறிகுறிகள்

- இலைகளில் வட்ட வடிவில் ஊதாவிலிருந்து சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் புண்கள் தோன்றும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- சரியான இடைவெளி பராமரித்து, செடிகளுக்கிடையே காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.
- சரியான ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் பின்பற்ற வேண்டும்.
- தாமிர பூசணக்கொல்லியை பயன்படுத்தி இந்நோயை கட்டுப்படுத்தலாம்.

7.5 மூலிகைப்பயிர்கள்

7.5.1 செங்காந்தள் மலர்

I பூச்சிகள்

1. செங்காந்தள் பேன்: *த்ரிப்ஸ் டபாஸி*

பூச்சியின் அடையாளம்

- இலைப்பேன் மஞ்சள் கலந்த அடர் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.
- காந்தள் மலர்ச்செடியில் இப்பேன்கள் கொண்டைக்கருகல் நச்சுயிரி நோயைப் பரப்புகின்றன.

AGRI_Practical.indd 305 03-01-2020 17:43:14