சேத அறிகுறிகள்

- நச்சுயிரி தாக்கப்பட்ட செடிகள் பழுப்பு நிறத்தில் நிறமாற்றம் அடைந்து பின்னர் கருகிவிடும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- 3.0% வேப்பெண்ணெய் கரைசலை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் இரு முறை தெளிக்க வேண்டும்.
- இமிடாகுளோப்ரிட் 125மிலி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.

2. லில்லி புழு: *பாலிடெல்லா க்ளோரியோசே*




பூச்சியின் அடையாளம்

- ஊதா நிறத்தில் வெள்ளை நிறப் புள்ளிகள் முன்னிறக்கைகளில் காணப்படும்

சேத அறிகுறிகள்

- இலைகள் பச்சையம் இழந்து காணப்படும்.
- செடியின் கடின தண்டுப்பகுதியைத் தவிர பிற பயிர் பாகங்கள் புழுக்களால் தாக்கப்பட்டிருக்கும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- வேப்பெண்ணெய் 0.5% (அ) வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தெளிக்க வேண்டும்.
- தயோடிகார்ப் 500கி/எக்டர் தெளிக்கலாம்.

II நோய்கள்

1. கிழங்கு அழுகல் நோய்: *ஸ்க்லிரோஷியம் ரால்ப்சி*

நோய்க் காரணி: பூசணம்

சேத அறிகுறிகள்

- கொடிகள் நிறம் மாறி வெளுத்து காய்ந்து விடும்.
- வேர்கள் கருமை நிறத்தில் காணப்படும்.
- கிழங்குகளில் பூசணவித்துகள் காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- டிரைக்கோடெர்மா ஆஸ்பெரல்லம் 2.5 கிகி/ எக்டர் என்ற அளவில் மண்ணில் இட வேண்டும்.
- சூடாமோனாஸ் ஃபுளூரசன்ஸ் 2 கி / லி மண்ணில் தெளிக்கலாம்.

7.5.2 நிலவேம்பு

I பூச்சிகள்

1. மாவுப்பூச்சி: *ஐசெர்யா பர்செஸி*



பூச்சியின் அடையாளம்

- பூச்சிகள் சிறியதாகவும், உடலின் மேல் வெள்ளை நிற மாவு போன்ற பூச்சு உடையதாகவும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இலைகள் மஞ்சள் நிறமாகி, சிறுத்துக் காய்ந்து விடும்.
- இலைகளின் மேல் கரும்பூசணப் படலம் காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- பொறி வண்டு மற்றும் கிரைசோபா இரைவிழுங்கிகள் இப்பூச்சிகளை உணவாக உட்கொள்வதால், பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை குறையும்.
- தாக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்ற வேண்டும்.
- 3.0% வேப்பெண்ணெய் அல்லது 5.0% வேப்பங்கொட்டை பருப்பு சாறு தெளிக்கலாம்.
- குளோர்பைரிஃபாஸ் 50 EC 500 மிலி/ எக்டர் தெளிக்கலாம்.

2. செதில் பூச்சி: *பேரசைசெட்டியா நைக்ரா*



AGRI_Practical.indd 306 03-01-2020 17:43:14