பூச்சியின் அடையாளம்

- வளர்ந்த செதில் பூச்சிகள் நீள்வட்ட வடிவிலும் சற்று மேலெழும்பியும் காணப்படும்.

சேத அறிகுறிகள்

- இலைகளில் இருந்தும், தண்டுகளில் இருந்தும் சாற்றை உறிஞ்சி சேதம் விளைவிக்கும்.
- இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- 3.0% வேப்பெண்ணெய் அல்லது 5.0% வேப்பங்கொட்டை பருப்பு சாறு தெளிக்கலாம்.
- சைபர்மெத்ரின் 0.25% தூள் மருந்தை தூவலாம்.

II நோய்கள்

1. வேர் அழுகல் நோய்:

மேக்ரோஃபொமினா ஃபாசியோலினா

நோய்க் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- வேர் மற்றும் தண்டுப்பகுதியில் சிறுசிறு கருப்பு நிற கடுகு போல் புள்ளிகள் தென்படும்.
- செடிகள் வாடி கருகிய தோற்றத்துடன் காணப்படும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- மண்ணில் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- கார்பன்டசிம் 1.0 கி / லி நீரில் கலந்து வேர்கள் நனையுமாறு இரண்டு முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஊற்ற வேண்டும்.

2. இலைப்புள்ளி நோய்:

கொலிட்டோடிரைக்கம் சிற்றினம்

நோய்க் காரணி: பூசணம்

அறிகுறிகள்

- இலைகளில் சிறுசிறு வட்ட புள்ளிகள் தோன்றும். புள்ளிகள் இணைந்து கருகலை ஏற்படுத்தும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- 1.0 % போர்டோ கலவையைத் தெளிக்க வேண்டும்.
- தைஃபுளுஸமைட் – 300 மிலி/எக்டர்.

7.5.3 சோற்றுக்கற்றாழை

I நோய்கள்

1. இலைப்புள்ளி நோய்:

ஆல்டர்னேரியா ஆல்டர்நேட்டா

நோய்க் காரணி: பூசணம்



அறிகுறிகள்

- சிறிய நீள வட்ட வடிவிலான அடர் பழுப்பு நிற இலைப்புள்ளிகள், அடர் வளையங்களுடன் இலைப்பரப்பு முழுவதும் பரவி செடிகள் உருக்குலையும்.

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

- தரமான நல்ல கன்றுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- பழைய செடியின் கழிவுகளை அகற்ற வேண்டும்.
- திரம் அல்லது கார்பன்டசிம் 3.0 கி / கிகி என்ற அளவில் கன்று நேர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- மேங்கோசெப் அல்லது காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு அல்லது கார்பன்டசிம் 1.0 கி / லி என்ற அளவில் பயன்படுத்தலாம்.

AGRI_Practical.indd 307 03-01-2020 17:43:15