




Para todas las situaciones, evaluar la disponibilidad de ensayos clínicos.

\*No financiado en España. <sup>§</sup>La célula de origen debe buscarse en todos los casos.

**1L:** primera línea; **CMR:** respuesta metabólica completa; **DA-EPOCH-R:** dosis ajustada de etopósido–doxorubicina–vincristina–ciclofosfamida–prednisona–rituximab; **DS:** *Deauville score*; **EOT:** fin de tratamiento (por sus siglas en inglés end of treatment); **FDG-PET:** tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa; **HD-MTX:** alta dosis intravenosa de metotrexato; **iPET:** PET interina en el ciclo 2, 3 o 4 según práctica local; **IPI:** índice pronóstico internacional; **IT-MTX:** metotrexato intratecal; **LBCL:** linfoma de células B grandes; **LCR:** líquido cefalorraquídeo; **LDH:** lactato deshidrogenasa; **MRI:** imagen por resonancia magnética; **PET:** tomografía por emisión de positrones; **PMBCL:** linfoma de células B primarias mediastínicas; **Pola-R-CHP:** polatuzumab vedotina–rituximab–ciclofosfamida–doxorubicina–prednisona; **PS:** estado funcional (por sus siglas en inglés *performance status*); **R-CEOP:** rituximab–ciclofosfamida–etopósido sustituido por doxorubicina–vincristina–prednisona; **R-CHOP:** rituximab–ciclofosfamida–doxorubicina–vincristina–prednisona; **R-CHOP14:** R-CHOP cada 14 días; **R-CHOP21:** R-CHOP cada 21 días; **R-COMP:** R-CHOP con doxorubicina liposomal no pegilada; **RT:** radioterapia; **SUV:** valor de captación estandarizado (por sus siglas en inglés standardized uptake value); **SNC:** sistema nervioso central; **TC:** tomografía computarizada.