

solucion23-06.pdf



limagod



Álgebra



1º Grado en Ingeniería Informática



Facultad de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Universitat Oberta de Catalunya



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

Álgebra/ Matemáticas I

SOLUCIÓN EXAMEN 23/06/2012

Exercici 1:

Realiza los cálculos siguientes:

a) Simplifica la expresión siguiente: $\frac{(2-i) \cdot (1-2i)^2}{2+i}$

b) Calcula las raíces quintas del complejo siguiente: $z = 16\sqrt{3} - 16i$ (proporciona los ángulos en grados y los resultados en forma polar)

Solución:

a) Operamos con la expresión, recordando que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} \frac{(2-i) \cdot (1-2i)^2}{2+i} &= \frac{(2-i) \cdot (1-4i+4i^2)}{2+i} = \frac{(2-i) \cdot (1-4i-4)}{2+i} = \frac{(2-i) \cdot (-3-4i)}{2+i} = \\ &= \frac{(-6-8i+3i+4i^2)}{2+i} = \frac{(-6-8i+3i-4)}{2+i} = \frac{-10-5i}{2+i} = \frac{(-5) \cdot (2+i)}{(2+i)} = -5 \end{aligned}$$

b) Escribimos el complejo z en forma polar:

$$\begin{aligned} m &= \sqrt{(16\sqrt{3})^2 + (-16)^2} = \sqrt{768 + 256} = \sqrt{1024} = 32 \\ \alpha &= \arctg \frac{-16}{16\sqrt{3}} = \arctg \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \arctg \frac{-\sqrt{3}}{3} = -30^\circ \end{aligned}$$

Tenemos, por tanto, que $z = 16\sqrt{3} - 16i = 32_{-30^\circ}$

Como nos piden las raíces quintas, debemos hacer:

$$\sqrt[5]{z} = \sqrt[5]{32_{-30^\circ}} = \left(\sqrt[5]{32} \right)_{\frac{-30+360k}{5}} \text{ para } k=0, 1, 2, 3, 4$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = \sqrt[5]{32} = 2$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{-30+360k}{5}$ para $k=0, 1, 2, 3, 4$

- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = -6^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 6^\circ + 72^\circ = 78^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 6^\circ + 144^\circ = 150^\circ$

No si antes decíste
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

WUOLAH

Álgebra/ Matemáticas I

- Si $k=3$, tenemos que $\beta_3 = 6^\circ + 216^\circ = 210^\circ$
- Si $k=4$, tenemos que $\beta_3 = 6^\circ + 288^\circ = 282^\circ$

Por tanto, las cinco raíces quintas del complejo $z = 16\sqrt{3} - 16i$ son:

$$2_{-6^\circ}, 2_{66^\circ}, 2_{138^\circ}, 2_{210^\circ}, 2_{282^\circ}$$

Ejercicio 2:

Sea E el subespacio vectorial de \mathbb{R}^6 generado por el conjunto de vectores siguiente:

$E = \{(b-ab, 0, 0, 0, 0, 0), (2b, 1-a, 0, 0, 0, 0), (3b, 3, 1-a, 0, 0, 0), (4b, 4, 4, 1-a, 0, 0), (5b, 5, 5, 5, 1-a, 0), (6b, 6, 6, 6, 6, 1-a)\}$, $a, b \in \mathbb{R}$. Sea $v = (1, 1, 1, 1, 1, 0)$

- a) Calcula la dimensión de E en función de a y b .
- b) Para el caso $a=1$ y $b=1$, encuentra una base del espacio vectorial. Pertenece v a E en este caso? En caso afirmativo encuentra sus coordenadas en la base anterior.

Solución:

a) Calculemos el rango de la matriz:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} b-ab & 2b & 3b & 4b & 5b & 6b \\ 0 & 1-a & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1-a & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix}$$


Calculemos el determinante 6×6 :

$$\begin{vmatrix} b-ab & 2b & 3b & 4b & 5b & 6b \\ 0 & 1-a & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1-a & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{vmatrix} = b \cdot \begin{vmatrix} 1-a & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1-a & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1-a & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{vmatrix} = b \cdot (1-a)^6$$

Así pues si $b \neq 0$ y $a \neq 1$ entonces la dimensión de E es 6.

Si $b=0$, entonces calculamos el rango de la matriz:

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊




WUOLAH

Álgebra



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la UOC

MUOLAH



- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Álgebra/ Matemáticas I

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1-a & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix} \text{ para la cual cosa calculamos el determinante:}$$

$$\begin{vmatrix} 1-a & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1-a & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1-a & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-a \end{vmatrix} = (1-a)^5$$

Así pues si $b=0$ y $a \neq 1$ entonces el rango de E es 5.

Si $b=0$ y $a=1$ tenemos

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 4 \text{ ya que podemos encontrar el menor } 4 \times 4 \text{ con determinante}$$

$$\text{distinto de cero: } \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$$

Por tanto la dimensión de E es 4

Ara queda el caso $a=1$ y $b \neq 0$. Queremos calcular el rango:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 2b & 3b & 4b & 5b & 6b \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 5 \text{ ya que podemos encontrar el menor } 5 \times 5 \text{ con}$$

$$\text{determinante distinto de cero: } \begin{vmatrix} 2b & 3b & 4b & 5b & 6b \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 720b \neq 0$$

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

Álgebra/ Matemáticas I

Así resumiendo tenemos:

Si $b \neq 0$ y $a \neq 1$ entonces la dimensión de E es 6.

Si $b=0$ y $a \neq 1$ o bien $a=1$ y $b \neq 0$ entonces la dimensión de E es 5.

Si $b=0$ y $a=1$ entonces la dimensión de E es 4.

b) En el caso $a=1$ y $b=1$ sabemos por el apartado anterior que la dimensión de E es 5.

Tenemos que E está definido por los vectores:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como podemos encontrar el menor 5x5 con determinante distinto de cero:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$$

Entonces los vectores $\{(2,0,0,0,0), (3,3,0,0,0), (4,4,4,0,0), (5,5,5,5,0), (6,6,6,6,0)\}$ son linealmente independientes porque contienen el menor anterior y son base de E cuando $a=1$ y $b=1$

Miramos si v pertenece a E en este caso planteando el sistema con la base encontrada:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Que nos da el sistema de ecuaciones:

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuoliah
Tu que eres tan bonita

WUOLAH

Álgebra/ Matemáticas I

$$\begin{cases} 2x+3y+4z+5t+6k=1 \\ 3y+4z+5t+6k=1 \\ 4z+5t+6k=1 \\ 5t+6k=1 \\ 6k=1 \\ 0=0 \end{cases} \quad \text{Que tiene solución } x=0, y=0, z=0, t=0, k=1/6.$$

Por tanto v pertenece a E y sus coordenadas en la base anterior son $(0,0,0,0,1/6)$.

Ejercicio 3:

a) Discutid el sistema de ecuaciones lineales según los valores del parámetro a :

$$\begin{cases} x-2y+z=a^2 \\ (2-a)x+(2a-4)y+(4-2a)z=5 \\ (a+1)x-(a+1)y+(a+1)z=a+1 \end{cases}$$

b) Resolved el sistema para $a=0$, en el caso que tenga solución.

Solución:

a) Se trata de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para discutirlo utilizaremos el teorema de Rouché-Frobenius. Calcularemos primero los valores de a para los cuales el rango de la matriz M sea máximo (es decir, $\text{rang}(M)=3$). Para estos valores el sistema será compatible determinado.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2-a & 2a-4 & 4-2a \\ a+1 & -a-1 & a+1 \end{pmatrix}, \quad MA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & a^2 \\ 2-a & 2a-4 & 4-2a & 5 \\ a+1 & -a-1 & a+1 & a+1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = -(a+1)(2-a) = 0 \text{ si } a = -1 \text{ o } a = 2.$$

La matriz M tiene rango 3 para todos los valores de a , a excepción de $a = -1, 2$. Así para $a \neq -1, 2$ tenemos $\text{rang}(M) = \text{rang}(MA) = 3$ y el sistema será **COMPATIBLE DETERMINADO**.

Para $a = -1$,

Álgebra/ Matemáticas I

$$\text{rang}(M) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \text{ y } \text{rang}(MA) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -6 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Así el sistema es **COMPATIBLE INDETERMINADO CON 1 GRADO DE LIBERTAD**.

Para $a = 2$,

$$\text{rang}(M) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = 2 \text{ y } \text{rang}(MA) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 3 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3$$

En este caso el sistema es **INCOMPATIBLE**.

Resumiendo:

- Para $a \neq -1, 2$ el sistema es **COMPATIBLE DETERMINADO**.
- Para $a = -1$ el sistema es **COMPATIBLE INDETERMINADO CON 1 GRADO DE LIBERTAD**.
- Para $a = 2$ el sistema es **INCOMPATIBLE**.

b) Para $a = 0$, hagamos la reducción de la matriz ampliada del sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Substituimos la 2fila por 2fila -2*(1fila) y la 3fila por 3fila-(1fila) y obtenemos

$$q(t) = (2 - t)(3 - t)(1 - t)$$

Los valores propios de f son, por tanto, el 2, el 3 y el 1, todos con multiplicidad algebraica 1.

- c) Tenemos que el polinomio característico descompone en factores lineales. Como que la multiplicidad algebraica es 1, automáticamente, la multiplicidad geométrica también es 1. Por tanto, el polinomio característico descompone en factores lineales y las multiplicidades algebraicas y geométricas de cada valor propio coinciden. De aquí se deduce que f diagonaliza.

- d) Para encontrar los vectores propios de f de valores propios 2, 3 y 1 tenemos que resolver los sistemas de ecuaciones lineales: $(A-2I)X=0$, $(A-3I)X=0$ y $(A-I)X=0$.
O sea:

$$(A + 2I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 3I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El subespacio de soluciones del primer sistema es: $\langle (1,0,1) \rangle$.

El subespacio de soluciones del segundo sistema es: $\langle (0,2,1) \rangle$.

El subespacio de soluciones del tercer sistema es: $\langle (0,0,1) \rangle$.

Por tanto, una base formada por vectores propios de f es :

$$\langle (1,0,1), (0,2,1), (0,0,1) \rangle$$