


Funciones trigonométricas (solución)


Solución

Vamos a resolver cada uno de los triángulos para obtener la medida final deseada, empezando desde el que está más abajo hasta llegar al triángulo deseado.


Nota: Los triángulos de la resolución no están hechos a medida, la idea es solo representar los datos de la resolución.




$$\cos(34) = \frac{8}{a} \Rightarrow a = \frac{8}{\cos(34)}$$




$$\cos(11) = \frac{b}{3.6 + a - 2.5} \Rightarrow b = (1.1 + a) \cos(11) \Rightarrow b = \left(1.1 + \frac{8}{\cos(34)}\right) \cos(11)$$




$$(2.9 + b - 2.1)^2 = 3.8^2 + c^2 \Rightarrow c = \sqrt{(b + 0.8)^2 - 3.8^2}$$




$$\tan(42) = \frac{d}{c - 3.2} \Rightarrow d = (c - 3.2) \cdot \tan(42)$$




$$\sin(37) = \frac{d}{e} \Rightarrow e = \frac{d}{\sin(37)} = \frac{(c - 3.2) \cdot \tan(42)}{\sin(37)}$$




$$\sin(53) = \frac{f}{e + 4.3} \Rightarrow f = \sin(53)(e + 4.3) \Rightarrow f = \sin(53) \left(\frac{(c - 3.2) \tan(42)}{\sin(37)} + 4.3 \right)$$



$$g^2 = 1.7^2 + (f - 2.2)^2 \Rightarrow g = \sqrt{1.7^2 + (f - 2.2)^2}$$



$$\cos(21) = \frac{g}{h} \Rightarrow h = \frac{g}{\cos(21)} \Rightarrow h = \frac{\sqrt{1,7^2 + (f - 2,2)^2}}{\cos(21)}$$



$$\sin(71) = \frac{i}{h + 1,7} \Rightarrow i = \sin(71) \left(\frac{\sqrt{1,7^2 + (f - 2,2)^2}}{\cos(21)} + 1,7 \right)$$

Finalmente, si ahora ponemos todos los cálculos juntos, tenemos que la medida del lado que buscábamos es

$$\sin(71) \cdot \left(\frac{\sqrt{\left(\sin(53) \cdot \left(4,3 + \left[\left(\sqrt{\left[\left(\frac{8}{\cos(34)} - 2,5 + 3,6 \right) \cos(11) - 2,1 + 2,9 \right]^2 - 3,8^2 - 3,2} \right) \frac{\tan(42)}{\sin(37)} \right] \right) - 2,2 \right)^2 + 1,7^2}}{\cos(21)} + 1,7 \right).$$

Si lo calculamos, obtenemos un valor aproximado de 12.073.