Dépistage génomique du virus de l'hépatite B (VHB) chez les donneurs bénévoles de sang , étude pilote au Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Treichville.

Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA

Poster N°: 059

Dembélé B[1], Bene K. I[1], Toni TA[2], Aké A.J.A[1], Kaboré S[1], Camara M.I[1], Sekongo Y.M[1]

1-Centre National de Transfusion Sanguine de Côte d'Ivoire
2-Laboratoire du Centre Intégré de Recherche d'Abidjan (CIRBA)

INTRODUCTION

Parmi les infections transmissibles par le sang, l'hépatite B constitue la première cause de rejet des produits sanguins en Côte d'Ivoire. Du fait de la notion de fenêtre sérologique et de l'existence de mutants, il demeure un risque résiduel de transmission du VHB par transfusion sanguine.

Le DGV offre l'opportunité d'une meilleure sécurité transfusionnelle en dépistant à la fois les donneurs porteurs de l'AgHBs et ceux présentant une infection occulte de l'hépatite B.

Cette étude princeps avait pour objectif général d'étudier la faisabilité du dépistage génomique du virus de l'hépatite B au CRTS de Treichville.

METHODES

Cette étude descriptive de type transversale menée du 1er avril au 10 juillet 2024 s'est déroulée au Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de Treichville à Abidjan et a inclus des donneurs de sang bénévoles. Les tests sérologiques pour la détection de l'AgHBs et de l'Ac anti-HBc ont été effectuées au laboratoire du CRTS. Le dépistage génomique viral (DGV) a été effectué sur les échantillons des donneurs AgHBs négatifs et ayant des anticorps anti-HBc totaux positifs par la technique de PCR classique au laboratoire du Centre Intégré de Recherche d'Abidjan (CIRBA)

RESULTATS

Au total nous avons inclus 158 donneurs bénévoles. Les caractéristiques de la population sont résumées dans le tableau I.

nous avons observé une prédominance masculine de 95,6 % (151/158). Le sex-ratio (H/F) était de 21.57. La tranche d'âge majoritaire était celle des donneurs de sang âgés de 38 à 47 (41,4%) ans suivie de celle des 48 à 57 (22,8%) et de celle de 28 à 37 ans (20,4%).

La séroprévalence des anti-HBc totaux chez les donneurs AgHBs négatif était de 24% (38/158). Les résultats des PCR classiques réalisées pour la détection de l'ADN du VHB ont montré que 10,5% (4/38) des échantillons AgHBs négatifs et anti-HBc totaux positifs avaient de l'ADN du VHB detectable (figure 2). La figure 1 montre un exemple des résultats des gels des PCR réalisées.

Table I: Caractéristiques socio-démographiques de la population d'étude

Variables	Effectif	Pourcentage (%)
Genre		
Homme	151	95,6
Femme	158	4,4
Sex-ratio	**21,6**	
Age		
[18-27[	14	8,6
[27 à 37[	32	20,4
[37 à 47[	65	41,4
[48 à 57[	36	22,8
[58 à 65]	11	6,8




Figure 1: Résultats de la PCR de deux séries d'échantillons sur gel d'agarose (1%).




Figure 2 : Résultats du dépistage génomique par PCR

CONCLUSION

Cette étude princeps a montré la nécessité de mettre en place le dépistage génomique viral (DGV) au CNTS afin de renforcer la sécurité transfusionnelle en Côte d'Ivoire et éviter la transmission de l'hépatite B occulte par la transfusion sanguine.

Dembélé Bamory Tel:+(225) 2721243373 mobile:+(225) 0101050750 email:d_bamory@yahoo.fr