Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com
TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE
Transfusion Clinique et Biologique 22 (2015) 215–272

Posters

01. Don de sang (organisation, sélection, recrutement, sociologie, éthique)

P001

Performances diagnostiques de HemoCue® et impact de son utilisation en pré-don au CNTS de Lomé (Togo)

K. Mawussi, H. Magnang, L. Feteke*, D.W. Maba, L.K. Nadjir, A. Kossibouko, K.L. Dzakou, A.Y. Segbena
CNTS, Lomé, Togo
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : fetekeloch@hotmail.com (L. Feteke)

Objectifs Évaluer la performance de HemoCue® au CNTS de Lomé ; évaluer la proportion de candidats au don ajournés ; définir les conditions de dosage de l'hémoglobine en pré-don.
Méthodologie Étude transversale du 15 novembre au 28 décembre 2011. Nous avons dosé l'hémoglobine à l'aide de HemoCue® chez 1291 candidats au don. Le taux d'hémoglobinea été contrôlé sur automate d'hématologie Celly Plus®chez 388 candidats. Traitement des données par les logiciels Excel et R.
Résultats Sur 1291 candidats au don, 28,12 % avaient un taux d'hémoglobine inférieur au seuil de défini dans l'étude (12 g/dL chez les hommes, 11 g/dL chez les femmes).
Selon le nombre de dons sur un an, les proportions de donneurs anémiés étaient de 7,88 %, 22,83 %, 34,79 % et 44,98 % respectivement chez les donneurs ayant fait un, deux, trois et quatre dons. Selon le nombre total de dons antérieurs, la fréquence de l'anémie était de 14,2 %, 33,88 %, 43,82 % et 59,28 % respectivement chez les donneurs ayant fait 1 à 5 dons, 6 à 10 dons, 11 à 20 dons et 21 à 50 dons. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative de HemoCue® pour l'anémie étaient respectivement de 93,19 %, 85,32 %, 94,20 % et 83,03 %.
Conclusion Le dosage de l'hémoglobine en pré-don a conduit à ajourner 28,12 % des donneurs. Il était plus indiqué pour les donneurs aux conjonctives moyennement colorées, au 3e don de l'année ou après au moins 5 dons antérieurs.
Mots clés Taux d'hémoglobine ; HemoCue® ; Donneurs de sang

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.003

P002

Prévalence de l'anticorps HBc chez les donneurs de sang à l'hôpital Laquintine de Douala au Cameroun

K. Kourouma[1,*], M.B. Sida[2], C. Leundji[1], J.C. Gapdo[3]
[1] *UDM/cliniques universitaires, Bangangté, Cameroun*
[2] *PNTS/Cameroun, Yaoundé, Cameroun*
[3] *Hôpital Laquintine, Douala, Cameroun*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : kk_transfusion@hotmail.com (K. Kourouma)

Le sang du donneur de sang contenant un Ac HBc mais séronégatif pour AgHBs pourrait transmettre le virus de l'hépatite B. Cette étude descriptive réalisée à la banque de sang de l'hôpital Laquantinie de Douala a pour but de déterminer la prévalence de l'Ac HBc chez les donneurs de sang testés séronégatifs pour AgHBs. Les donneurs inclus sont testés négatifs pour les autres marqueurs d'ITTS (VIH, HCV, syphilis) à l'Elisa. La prévalence de l'Ac HBc chez les 250 donneurs inclus dans cette étude est de 57 %. La prévalence des anti-HBc est plus élevée chez les donneurs familiaux (59 %) que chez les donneurs bénévoles (42,9 %), bien que statiquement non significative. Cette étude montre l'intérêt du dépistage de l'anti-HBc chez les donneurs de sang et recommande de la compléter par le dépistage de l'ADN du virus de l'hépatite B circulant.
Mots clés Prévalence ; Hépatite B ; Anticorps anti-HBc ; Donneurs de sang ; Douala

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.004

P003

Connaissance, attitudes et pratiques du don de sang et de la transfusion sanguine dans le département du NDE au Cameroun

K. Kourouma*, D. Telly, F. Kanmangne, L. Kaptue
UDM/cliniques universitaires, Bangangté, Cameroun
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : kk_transfusion@hotmail.com (K. Kourouma)

Cette étude transversale prospective par interview s'est effectuée d'avril à juin 2012 dans les établissements scolaires et les formations sanitaires du district de santé de Bangangté dans le département du NDE. Elle a pour but de cerner la perception du don de sang par les jeunes scolarisés ainsi que les connaissances en pratique transfusionnelle du personnel des différentes structures hospitalières de ce département. Sur les 1025 individus enquêtés, 90 donneurs de sang ont été recensés (soit 8,7 %). Le bilan de santé gratuit (40 %) et la perspective d'un besoin en sang personnel à l'avenir (47,7 %) restent les principales motivations au premier don chez les enquêtés. La crainte de transmission virale (44,3 %),