

昆明理工大学 2019 年硕士研究生招生入学考试试题(A 卷)

考试科目代码：628

考试科目名称：西医综合

考生答题须知

- 1.所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。
- 2.评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。
- 3.答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。
- 4.答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、A1 型题 (答题说明：单句型最佳选择题。每一道考题下面均有 4-5 个备选答案。在答题时，只需从中选择一个最合适的答案，并在答题纸上标清题号和选项，以示正确回答。共有 160 题，每题 1.5 分，合计 240 分。)

1. 由肾上腺皮质束状带细胞分泌的激素主要是
A. 醛固酮
B. 脱氢表雄酮
C. 雌二醇
D. 皮质醇
2. 甲肝神经兴奋时血糖浓度迅速升高，这是下列哪种激素的作用
A. 胰高血糖素
B. 生长激素
C. 肾上腺素
D. 糖皮质激素
3. 在环境温度低于 30℃，机体处于安静状态下的主要散热方式是
A. 辐射散热
B. 传导散热
C. 对流散热
D. 不感蒸发
E. 可感蒸发
4. 调节机体各种机能的两大信息传递系统是
A. 第一信号系统与第二信号系统
B. 第一信使与第二信使
C. cAMP 与 cGMP
D. 中枢神经系统与外周神经系统
E. 神经系统与内分泌系统
5. 组织兴奋后处于绝对不应期时其兴奋性为
A. 无限大
B. 大于正常
C. 等于正常
D. 小于正常
E. 零
6. 在神经-骨骼肌接头完成信息传递后，能消除接头处神经递质的酶是
A. $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶
B. 乙酰胆碱酯酶
C. 腺苷酸环化酶

D. 磷酸二酯酶

7.0.9%NaCl 溶液和 10%葡萄糖溶液对人细胞内液来说

- A. 两者都是等渗液
- B. 两者都是高渗液
- C. 两者都是低渗液
- D. 前者是低渗液，后者是高渗液
- E. 前者是等渗液，后者是高渗液

8.动脉舒张压的高低主要反映

- A. 每搏输出量的多少
- B. 外周阻力的大小
- C. 大动脉弹性的好坏
- D. 心脏泵血功能的好坏
- E. 血管充盈的程度

9.肾脏近端小管对小管液中有用成分重吸收的特点是

- A. 重吸收的物质种类少
- B. 各种物质的重吸收最少
- C. 受神经和体液因素调节
- D. 小管液与上皮细胞内液保持等渗

10.下列关于化学性突触传递特征的叙述，正确的是

- A. 双向传播
- B. 不衰减传递
- C. 兴奋节律不变
- D. 对内环境变化敏感

11.下列选项中，主要与毒蕈碱样有关的是

- A. 心脏活动加强
- B. 支气管痉挛
- C. 胃肠道活动减弱
- D. 瞳孔扩大

12.下列关于肺表面活性物质的描述，错误的是

- A. 能降低肺的顺应性
- B. 能降低肺泡表面张力
- C. 能减少肺的弹性阻力
- D. 由肺泡 II 型细胞分泌
- E. 脂质成分为二棕榈酰卵磷脂

13.下列激素属于类固醇激素的是

- A. 生长激素释放因子 (GHRF)
- B. 生长激素 (GH)
- C. 促卵泡激素 (FSH)
- D. 雌激素
- E. 催乳素

14.女性正常排卵的黄体

- A. 分泌孕酮
- B. 分泌雌激素
- C. 分泌黄体生成素
- D. 分泌孕酮及雌激素
- E. 分泌孕酮、雌激素和黄体生成素

15.在跨膜物质转运中，转运体和载体转运的主要区别是

- A. 转运体转运需直接耗能
- B. 转运速率有明显差异
- C. 转运体转运没有饱和现象

- D. 转运体可同时转运多种物质
16. 促红细胞生成素主要作用是促进
- A. 多能造血干细胞进入细胞周期
 - B. 早期红系祖细胞增值、分化
 - C. 晚期红系祖细胞增值、分化
 - D. 幼红细胞增殖和合成血红蛋白
17. 一般情况下, 动脉粥样硬化患者
- A. 收缩压无变化
 - B. 舒张压无变化
 - C. 脉压增大
 - D. 大动脉顺应性大
18. 静脉注射肾上腺素后不出现下列哪项生理效应
- A. 心肌收缩力加强
 - B. 心率增快
 - C. 组织液生成减少
 - D. 内脏和皮肤血管收缩
19. 下列哪种情况能使静脉血 P_{O_2} 降低
- A. 贫血
 - B. CO 中毒
 - C. 剧烈运动
 - D. 亚硝酸盐中毒
20. 下列关于消化道平滑肌生理特性的叙述, 正确的是
- A. 兴奋性比骨骼肌高
 - B. 伸展性小
 - C. 收缩缓慢
 - D. 对化学刺激不敏感
21. 迷走神经对胰腺分泌的调节是
- A. 引起酶多、水和 HCO_3^- 少的分泌
 - B. 引起水、 HCO_3^- 多而酶少的分泌
 - C. 引起水、 HCO_3^- 和酶均多的分泌
 - D. 引起酶和 HCO_3^- 多、水少的分泌
22. 下列关于铁在小肠被吸收的叙述, 正确的是
- A. 铁都以 Fe^{3+} 的形式被吸收
 - B. 植酸, 草酸、鞣酸可促进铁的吸收
 - C. 胃酸及维生素可抑制铁的吸收
 - D. 铁主要在十二指肠和空肠被吸收
23. 兴奋性突触后电位
- A. 即突触后神经元处于兴奋状态
 - B. 由突触后膜 K^+ 电导增加而产生
 - C. 可随突触前递质释放增多而加大
 - D. 由突触后膜 Ca^{2+} 电导增加而产生
24. 下列关于免疫球蛋白变性的叙述, 哪项是不正确的
- A. 原有的抗体活性降低或丧失
 - B. 溶解度增加
 - C. 蛋白质的空间构象破坏
 - D. 易被蛋白酶水解
25. 关于酶的叙述, 错误的是
- A. 酶促反应具有特异性
 - B. 酶能对特异底物起高效催化作用
 - C. 所有的酶都是蛋白质

D. 酶是机体内催化各种代谢反应最主要的催化剂

26.糖酵解的终产物是

- A. 乳酸
- B. 3-磷酸甘油醛
- C. 丙酮酸
- D. 乙酰 CoA

27.最直接联系核苷酸合成与糖代谢的物质是

- A. 葡萄糖
- B. 6-磷酸葡萄糖
- C. 1-磷酸葡萄糖
- D. 1, 6-二磷酸果糖
- E. 5-磷酸核糖

28.遗传密码的简并性是指

- A. 蛋氨酸密码可作起始密码
- B. 一个密码子可代表多个氨基酸
- C. 多个密码子可代表同一氨基酸
- D. 密码子与反密码子之间不严格配对
- E. 所有生物可使用同一套密码

29.下列选项中,不属于重组 DNA 技术常用工具酶的是

- A. 拓扑异构酶
- B. DNA 连接酶
- C. 逆转录酶
- D. 限制性核酸内切酶

30.肾上腺素结合受体活化 G 蛋白后将产生的作用是

- A. 激活腺苷酸环化酶
- B. 抑制腺苷酸环化酶
- C. 激活鸟苷酸环化酶
- D. 抑制鸟苷酸环化酶

31.不属于抑癌基因的是

- A. P53
- B. Rb
- C. APC
- D. erb

32.分析组织中的某种 mRNA 水平是,采用哪种方法最合适

- A. Southern blot
- B. Northern blot
- C. Western blot
- D. Dot blot

33.PCR 反应中,所设计引物的长度一般为

- A. 5-10 个核苷酸
- B. 15-30 个核苷酸
- C. <50 个核苷酸
- D. 长度任意

34.脑中氨的主要去路是

- A. 扩散入血
- B. 合成尿素
- C. 合成嘌呤
- D. 合成氨基酸
- E. 合成谷氨酰胺

35.合成 DNA 的原料是

- A. dAMP dGMP dCMP dTMP

- B. dATP dGTP dCTP dTTP
- C. dADP dGDP dCDP dTDP
- D. dATP dGTP dCTP dUTP
- E. dAMP dGMP dCMP dUMP

36. 维系蛋白质一级结构的化学键是

- A. 盐键
- B. 疏水键
- C. 氢键
- D. 二硫键
- E. 肽键

37. 人体合成及供应全身胆固醇能力最强的组织是

- A. 肾上腺与脑
- B. 肝与小肠
- C. 小肠与肾上腺
- D. 肝与脑

38. 尿素合成过程的限速酶是

- A. 氨基甲酰磷酸合成酶
- B. 鸟氨酸氨基甲酰转移酶
- C. 精氨酸代琥珀酸合成酶
- D. 精氨酸代琥珀酸裂解酶

39. 关于原核生物 DNA 聚合酶的叙述, 下列哪项是错误的

- A. 包括 DNA-polI、II、III
- B. DNA-polIII 的活性高于 DNA-polI
- C. DNA-polIII 在复制链的延长中起主要作用
- D. 三种 DNA-pol 都有 5' → 3' 核酸外切酶活性

40. 下列对逆转录的叙述不正确的是

- A. 以 RNA 为模板合成双链 DNA
- B. 反转录的合成原料为 4 种 dNTP
- C. 反转录与转录相似, 均不需要引物
- D. RNA-DNA 杂化双链为过程的中间产物

41. 放射治疗广泛应用于很多肿瘤。对破坏迅速生长的细胞, 哪项作用机制正确

- A. 破坏 DNA 中嘌呤环
- B. 分开 DNA 双螺旋
- C. 破坏 DNA-RNA 转录复合体
- D. DNA 去甲基

42. 下列情况可引起框移突变的是 DNA 链中

- A. A 的缺失
- B. G 转换为 I
- C. U 转换为 C
- D. C 转换为 T

43. 脂褐素大量增加最常见于

- A. 细胞萎缩
- B. 细胞坏死
- C. 细胞凋亡
- D. 细胞水样变性
- E. 细胞玻璃样变性

44. 结节性动脉周围炎的血管壁坏死是

- A. 液化性坏死
- B. 纤维素样坏死
- C. 干酪性坏死
- D. 脂肪坏死

E. 固缩坏死

45.组织修复过程中,再生能力弱的组织是

- A. 上皮组织
- B. 纤维组织
- C. 软骨组织
- D. 骨组织
- E. 毛细血管

46.主要由纤维蛋白构成的血栓是

- A. 透明血栓
- B. 红色血栓
- C. 混合血栓
- D. 白色血栓
- E. 附壁血栓

47.血道转移的确切根据是

- A. 恶性肿瘤细胞侵入静脉
- B. 恶性肿瘤细胞侵入动脉
- C. 血液中发现肿瘤细胞
- D. 瘤细胞栓塞于远隔器官
- E. 在远隔器官形成同一类型肿瘤

48.增生的腺体密集排列,出现背靠背现象是指子宫内膜增生症的

- A. 单纯性增生
- B. 不典型增生
- C. 复杂性增生
- D. 癌前病变

49.关于前列腺增生症的叙述,不正确的是

- A. 增生的成分主要是纤维、平滑肌和腺体
- B. 腺腔内可见淀粉小体
- C. 基膜多不完整
- D. 极少发生恶变

50.结核结节主要由什么细胞构成

- A. 浆细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 成纤维细胞
- D. 类上皮细胞和 Langhans 巨细胞

51.下列哪种情况不能算作机化

- A. 肺结核空洞由肉芽组织充填治愈
- B. 脾脏新鲜梗死变为梗死瘢痕
- C. 血管内血栓再疏通
- D. 浆膜面纤维素性粘连变为纤维性粘连

52.下述脏器中,哪个容易发生出血性梗死

- A. 心
- B. 肾
- C. 肺
- D. 脑

53.引起原发性颗粒性固缩肾的最主要病变是

- A. 部分肾小球纤维化
- B. 肾间质纤维组织增生
- C. 肾间质淋巴细胞浸润
- D. 入球小动脉玻璃样变性
- E. 部分肾小球代偿性肥大

54.大叶性肺炎是属于

- A. 化脓性炎症
- B. 浆液性炎症
- C. 增生性炎症
- D. 出血性炎症
- E. 纤维素性炎症

55.下述有关食管癌的描述中，哪项是错误的

- A. 食管上段最常见
- B. 鳞状细胞癌多见
- C. 可见原位癌
- D. 亚硝胺与食管癌发生有关
- E. 可以多中心发生

56.霍奇金病具有诊断意义的细胞主要是

- A. 霍奇金细胞
- B. 陷窝细胞
- C. 多形性细胞
- D. R-S 细胞
- E. 未分化细胞

57.快速进行性肾小球肾炎主要增生的细胞是

- A. 内皮细胞
- B. 系膜细胞
- C. 脏层上皮细胞
- D. 壁层上皮细胞

58.急性细菌性痢疾的典型肠道病变性质为

- A. 化脓性炎
- B. 卡他性炎
- C. 假膜性炎
- D. 出血性化脓性炎
- E. 蜂窝织炎

59.其来源与巨噬细胞无关的是

- A. 泡沫细胞
- B. 心衰细胞
- C. 伤寒细胞
- D. 印戒细胞

60.下列关于肿瘤生长方式的叙述，错误的是

- A. 良性肿瘤生长缓慢
- B. 良性肿瘤均为外生性生长
- C. 恶性肿瘤可呈外生性生长
- D. 恶性肿瘤的浸润往往出现于基底部

61.诊断系统性红斑狼疮的特征性依据是

- A. 狼疮细胞
- B. 狼疮小体
- C. 狼疮带
- D. 狼疮肾

62.女，25岁，患甲亢6年，行双侧甲状腺次全切除术治疗，术后次日，口唇手指麻木，有时四肢抽搐，但呼吸顺畅。如再发生四肢抽搐其最恰当的处理是

- A. 日服钙片
- B. 口服维生素 D
- C. 日服安定片
- D. 静脉慢注葡萄糖酸钙液

63.嵌顿疝和绞窄疝的主要区别是

- A. 疝内容物是否有血运障碍
 - B. 是否有急性肠梗阻的表现
 - C. 是否有腹膜刺激征
 - D. 是否有休克
- 64.腹部闭合性损伤，在观察期间措施不恰当的是
- A. 不随便搬运患者，以免加重伤情
 - B. 不给饮食，以防消化道穿孔者腹腔污染加重
 - C. 注射止痛剂，以防止创伤性休克
 - D. 注射广谱抗生素，预防和治疗可能存在的感染
- 65.腹腔内空腔脏器破裂确诊后其治疗原则是
- A. 迅速手术治疗
 - B. 先救治休克，待休克控制后再手术治疗
 - C. 先救治休克再手术，但短时间处理后仍不能控制休克，也应立即手术
 - D. 保守治疗 24 小时无效即手术
- 66.男，30 岁，急性腹膜炎术后 6 天，体温上升- 38℃，伴有腹泻及里急后重，首选检查项目是
- A. 大便常规
 - B. 直肠指诊
 - C. 立位腹平片
 - D. 腹腔穿刺
- 67.混合痔是指
- A. 痔与肛瘘同时存在
 - B. 内痔和外痔在不同的部位同时存在
 - C. 直肠上下静脉丛彼此吻合形成的痔
 - D. 环形内痔
- 68.门脉高压症主要临床表现有
- A. 疼痛、黄疸、乏力
 - B. 腹痛、乏力、贫血
 - C. 肝大、腹水、消瘦
 - D. 脾大、脾亢、呕血和腹水
- 69.急性结石性胆囊炎最常见的致病菌是
- A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 大肠杆菌
 - C. 肠球菌
 - D. 绿脓杆菌
- 70.急性坏死性胰腺炎引起的休克常是
- A. 失液性休克
 - B. 感染性休克
 - C. 低血容量性休克
 - D. 多源性休克
- 71.测定膀胱残余尿，最合适又准确的方法是
- A. 膀胱区叩诊
 - B. 静脉尿路造影
 - C. 排尿后立即导尿
 - D. 耻骨上膀胱穿刺
- 72.良性前列腺增生症最重要的症状是
- A. 尿频
 - B. 尿潴留
 - C. 会阴部胀痛
 - D. 进行性排尿困难
- 73.X 线检查对于骨折的重要意义是
- A. 了解骨质密度

- B. 明确骨折的诊断
C. 判断骨折的预后
D. 了解组织的损伤情况
74. Codman 三角多见于
A. 骨瘤
B. 骨肉瘤
C. 软骨肉瘤
D. 骨巨细胞瘤
75. 诊断甲状腺乳头状癌最重要的依据是
A. 癌细胞核明显异型
B. 癌细胞有大量核分裂象
C. 癌细胞核明显深染
D. 癌细胞核有粗大核仁
E. 癌细胞核呈毛玻璃状
76. 大量出汗易导致
A. 等渗性缺水
B. 低渗性缺水
C. 高渗性缺水
D. 水中毒
77. 下列关于自体输血的描述, 错误的是
A. 可节约库血, 减少输血反应及疾病传播
B. 无需检查血型和交叉配血试验
C. 由于自体输血过程繁杂, 目前不提倡采用
D. 预存式自体输血时, 可于术前 1 个月开始采血, 每 3~4 天 1 次, 每次 300~400ml
78. 抗菌药物在外科疾病应用中, 下列哪项叙述不正确
A. 抗菌药物应用可减少术后并发症, 增加手术安全性
B. 严重创伤, 大面积烧伤应预防性应用抗菌药物
C. 全身情况不良的患者, 应尽量选用杀菌性的抗生素治疗感染
D. 严重感染者, 在体温正常、全身情况和局部感染灶好转后 3~4 天即可停药, 不需使用更长时间
E. 肾功能中度减退者, 首次给药后, 每次应给正常剂量的 $1/2 \sim 1/5$
79. 下述应激性溃疡的名称中哪个与烧伤有关
A. 急性消化性溃疡
B. 糜烂性胃炎
C. 出血性胃炎
D. Curling 溃疡
E. Cushing 溃疡
80. 关于休克的治疗, 下列不正确的是
A. 于 5~10 分钟内快速静注等渗盐水 250ml, 如血压升高而 CVP 不变, 提示血容量不足
B. 休克少尿时可应用多巴胺治疗
C. DIC 时注意应用肝素治疗
D. 脓毒性休克时应首先处理感染病灶
81. 世界卫生组织推荐的癌痛治疗方案是
A. 二阶梯方案
B. 三阶梯方案
C. 四阶梯方案
D. 五阶梯方案
82. 关于拆线时间的叙述, 错误的是
A. 减张缝合应在术后 14 天
B. 会阴部在术后 6~7 天
C. 背部、臀部在术后 7~9 天
D. 头面颈部在术后 10 天

- 83.在人体抵抗力降低时，原本不致病的菌群变成致病菌，引起的感染是
- A. 医院内感染
 - B. 二重感染
 - C. 机会性感染
 - D. 非特异性感染
- 84.闭合性肋骨骨折患者，出现下列哪项征象提示合并肺或支气管损伤
- A. 伤侧胸腔积血
 - B. 伤侧皮下气肿
 - C. 伤肺湿啰音
 - D. 伤肺呼吸音减低
- 85.进行性胸腔内出血最可靠的诊断依据是
- A. 伤后 6 小时置胸腔闭式引流出血量 500ml
 - B. 伤后 24 小时共引出 1200ml 陈旧性积血
 - C. 观察 3 小时胸腔引流量均为 200ml/h 以上
 - D. 胸穿抽出不凝血液
- 86.下列能够确诊食管癌的是
- A. 进行性吞咽困难病史
 - B. 食管脱落细胞检查
 - C. 食管吞钡 X 线摄片
 - D. 胸部 X 线摄片
- 87.无菌手术后手套未破，连续施行另一手术时应
- A. 直接更换手套、手术衣
 - B. 不必更换手套手术衣
 - C. 按规定方法重新浸泡酒精 5 分钟后穿手术衣、戴手套
 - D. 不必重新刷手，仅浸泡酒精 5 分钟穿手术衣、戴手套
 - E. 以上都不是
- 88.下列哪项关于中心静脉压的叙述是不正确的
- A. 中心静脉压的正常值是 0.49~0.98kPa (5~10cmH₂O)
 - B. 中心静脉压的变化一般比动脉压变化较晚
 - C. 中心静脉压低于 0.49kPa (5cmH₂O) 时，表示血容量不足
 - D. 中心静脉压高于 1.47 kPa (15cmH₂O) 时，提示有肺循环阻力增加，心功能不全
 - E. 中心静脉压受血容量、静脉血管张力等因素的影响
- 89.术后腹胀主要是由于
- A. 细菌产生的气体
 - B. 腹膜后血肿
 - C. 组织代谢产生的气体
 - D. 血液内气体弥散到肠腔内
 - E. 咽下的空气积存与肠腔内过多
- 90.施行肠外营养最严重的并发症是
- A. 气胸
 - B. 空气栓塞
 - C. 低钾血症
 - D. 高血糖致高渗性非酮性昏迷
 - E. 导管性脓毒症
- 91.关于外科感染分类的叙述，哪项是错误的
- A. 丹毒、急性阑尾炎、急性乳腺炎等均属特异性感染，非一般感染
 - B. 条件感染指病程在 3 周以内
 - C. 条件性感染指平常为非致病的病原菌乘机体抵抗力下降时乘机而入引起的感染
 - D. 院内感染的主要致病菌是条件致病菌
 - E. 病程超过 2 个月者为慢性感染
- 92.关于骶椎麻醉（骶麻），下列哪项是正确的

- A. 是硬膜外麻醉
 - B. 别名为鞍区阻滞
 - C. 易引起马尾综合征
 - D. 不易发生局麻药中毒
 - E. 睾丸切除术可用这种麻醉方法
93. 心肺复苏心脏按压时，胸外心脏按压的频率应为
- A. 50~60次/分
 - B. 60~80次/分
 - C. 80~100次/分
 - D. 100~120次/分
 - E. 120~140次/分
94. 关于甲亢手术治疗，下列哪项叙述是正确的
- A. 通常需切除双侧腺体的60%~70%
 - B. 处理甲状腺上血管时应远离甲状腺^{上级}
 - C. 结扎甲状腺下动脉要尽量离开腺体背面靠近颈总动脉处
 - D. 甲状腺峡部应予保留
 - E. 止血充分时，术野可不放置引流
95. 乳癌局部皮肤呈“橘皮样”改变的原因是
- A. 肿物压迫引起
 - B. 癌肿位置深，侵及Cooper韧带所致
 - C. 癌细胞侵及或堵塞乳房表浅淋巴管导致淋巴水肿所致
 - D. 肿物与乳房皮肤粘连所致
 - E. 肿瘤周围的炎性改变引起
96. 下列选项中，不属于无张力疝成形术优点的是
- A. 适应于某些有腹压增高的患者
 - B. 术后下地早、恢复快
 - C. 复发率低
 - D. 较常规手术不易感染
97. 下列哪种疾病与胃癌发病无关
- A. 萎缩性胃炎
 - B. 胃溃疡
 - C. 胃息肉
 - D. 胃平滑肌瘤
 - E. 胃大部切除术后残胃
98. 肠套叠的三大典型症状是
- A. 腹痛、发热、黄疸
 - B. 腹痛、脓血便、发热
 - C. 腹痛、血便、里急后重
 - D. 腹痛、血便、腹部肿块
 - E. 血便、腹部肿块、发热
99. 直肠指检不易发现的病变是
- A. 肛痿
 - B. 直肠息肉
 - C. 内痔
 - D. 肛管直肠癌
 - E. 盆腔脓肿
100. 治疗胆囊结石，方法正确且效果确切的是
- A. 药物溶石疗法
 - B. 体外震波碎石法
 - C. 经皮胆囊取石法
 - D. 胆囊切除术

E. 胆囊切除、胆总管探查引流术

101. 下述哪种表现不是血栓闭塞性脉管炎的特点

- A. 患者多为男性青壮年
- B. 病变主要侵袭四肢中、小动静脉
- C. 肢体缺血症状多是周期性发作
- D. 反复发作游走性浅静脉炎
- E. X线检测显示动脉有钙化斑

102. 利尿剂治疗心功能不全的作用是通过

- A. 排钠排水
- B. 提高心肌收缩力
- C. 增加心排血量
- D. 减轻水肿
- E. 降低动脉压

103. 直接作用与血管平滑肌，降低心脏前后负荷的药物是

- A. 硝普钠
- B. 多妥拉明
- C. 酚妥拉明
- D. 哌唑嗪
- E. 巯甲基丙脯酸

104. 关于二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全，下列哪项不正确

- A. 是风湿性心脏病的常见组合形式
- B. 由于二尖瓣狭窄致心排血量减少，使左心室扩大延缓
- C. 约 3/4 患严重二尖瓣狭窄病人可伴有不同程度的主动脉瓣关闭不全
- D. 心排血量增加可使外周血管征缺如
- E. 心尖部第一心音可不亢进

105. 下列关于二尖瓣关闭不全听诊特点的叙述，正确的是

- A. 第二心音出现延后
- B. 不出现第三心音
- C. 杂音可掩盖第一心音
- D. 杂音多呈递增型
- E. 杂音不向胸骨左缘及心底部传导

106. 下列哪项不是主动脉瓣狭窄的主要临床表现

- A. 栓塞
- B. 心绞痛
- C. 晕厥
- D. 左心功能不全
- E. 猝死

107. 以下哪些无创性检查能准确地反映主动脉瓣狭窄程度

- A. 心电图检查
- B. 心音图检查
- C. 心脏 X 线检查
- D. 二维超声心动图
- E. 心尖搏动图检查

108. 属于心电图负荷试验禁忌症的是

- A. 心电图 ST 段水平下降 $>0.15\text{mV}$
- B. 稳定性心绞痛行 PTCA 术后三天
- C. 无并发症的急性心肌梗死后一周
- D. 频发室性期前收缩
- E. 心房颤动患者

109. 心肌酶对诊断急性心肌梗死特异性最高的是

- A. CK-MB 及 LDH2

- B. CK-MM 及 LDH1
- C. CK-MB 及 LDH1
- D. CK-MB 及 LDH3
- E. CK-BB 及 LDH1

110.关于急性心肌梗死并发症，下列哪项正确

- A. 乳头肌断裂多见于二尖瓣前乳头肌
- B. 心脏破裂多见于室间隔穿孔破裂
- C. 心室壁瘤对发于心梗后三个月
- D. 急性心梗早起可伴发肺梗死
- E. 心梗后综合征发生率约为 1%~2%

111.关于急性心肌梗死溶栓治疗，下列哪项不正确

- A. 心电图出现病理性 Q 波，不宜再溶栓
- B. 心肺复苏术后，不宜再溶栓
- C. 采用 rt-PA 溶栓后要随即应用肝素抗凝
- D. 再灌注心律失常出现与否不是溶栓成败的主要标准
- E. 用尿激酶作静脉溶栓，首次剂量宜 150 万单位

112.急性心肌梗死应用主动脉内气囊反搏术的最佳适应症是

- A. 并发心源性休克
- B. 并发急性左心衰竭
- C. 并发恶性心律失常
- D. 并发右心室梗死
- E. 并发慢性肾功能不全

113.高血压病死亡原因最常见的为

- A. 心肌梗死
- B. 脑血管意外
- C. 肾衰竭
- D. 心功能不全
- E. 心律失常

114.下列哪一项不是肾病性水肿的机制

- A. 血浆胶体渗透压下降
- B. 激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- C. 肾小管重吸收增加
- D. 肾小球滤过率下降
- E. 抗利尿激素分泌增加

115.下列选项中，属于内脏性腹痛特点的是

- A. 疼痛部位不确切，接近腹中线
- B. 疼痛程度剧烈而持续
- C. 可有局部腹肌强直
- D. 疼痛可因体位变化而加重

116.下列有关胃食管反流病烧心的描述，错误的是

- A. 烧心是指胸骨后或剑突下烧灼感
- B. 常在餐后半小时出现
- C. 腹压增高时可加重
- D. 弯腰时可加重
- E. 卧位可加重

117.关于消化性溃疡的叙述，哪一项是不正确的

- A. 在临床上，十二指肠溃疡较胃溃疡多见
- B. 绝大多数病例病变位于胃和十二指肠
- C. 男性发病多于女性
- D. 全世界均多见
- E. 童年和老人均罕见

118. 下列导致十二指肠溃疡胃酸分泌异常的因素中哪项不正确
- A. 壁细胞对胃泌素特别敏感
 - B. 胃酸反馈性抑制失灵
 - C. 进餐刺激后的胃酸分泌在溃疡活动期增强
 - D. 晚间胃酸分泌明显增多
 - E. 胃排空减慢
119. 非甾体抗炎药(NSAID)引起的消化性溃疡, 当不能停用 NSAID 时, 首选的治疗药物是
- A. 雷尼替丁
 - B. 硫糖铝
 - C. 西沙必利
 - D. 奥美拉唑
120. 治疗消化性溃疡时应用下列何种药物抑制胃酸和胃蛋白酶分泌最有效
- A. 酸泵抑制剂
 - B. H_2 受体拮抗剂
 - C. M胆碱能受体阻滞剂
 - D. 胃泌素受体拮抗剂
 - E. 胃酸中和剂
121. 关于肠结核的临床表现, 下列哪项不正确
- A. 腹泻是溃疡型肠结核的主要临床表现之一
 - B. 腹部肿块主要见于增生型肠结核
 - C. 多见于青少年与壮年
 - D. 多数起病缓慢
 - E. 多不伴有肺结核
122. 对肠结核的诊断有重要意义的检查方法是
- A. 大便及痰液皆找到抗酸杆菌
 - B. 乙状结肠镜检查
 - C. X线钡餐检查
 - D. OT 试验
 - E. 血沉
123. 下列哪一项不是肝硬化代偿期的表现
- A. 乏力、食欲减退
 - B. 食管和胃底静脉曲张
 - C. 肝脏质地结实或偏硬
 - D. 脾脏中度肿大
 - E. 肝功能轻度异常
124. 肝硬化患者在很短时间里出现腹痛和大量血性腹水, 不伴有发热, 应首先考虑可能并发
- A. 原发性腹膜炎
 - B. 继发性肝癌
 - C. 结核性腹膜炎
 - D. 肝肾综合征
 - E. 门静脉血栓形成
125. 原发性肝癌的发生与下列哪种因素最有关
- A. 肠道戊型肝炎病毒感染
 - B. 肠道寄生虫感染
 - C. 肠道细菌感染
 - D. 黄曲霉毒素污染
 - E. 酒精中毒
126. 关于肝性脑病的氨中毒学说, 下列正确的是
- A. NH_4^+ 有毒性, 能透过血脑屏障
 - B. 肠内 $pH > 6$ 时, NH_3 不易被吸收
 - C. 低钾碱中毒时增加氨毒性
 - D. 腹泻时增加氨毒性

E. 高血糖时增加氨毒性

127.哪种药物可控制 Graves 疾病病人的部分症状，但不能降低甲状腺素的合成与释放

- A. 普萘洛尔
- B. 卡比马唑
- C. 丙硫氧嘧啶
- D. 复方碘溶液

128.下列那种治疗白血病的药物不作用于 S 期

- A. 长春新碱
- B. 阿糖胞苷
- C. 氨甲喋呤（甲氨蝶呤）
- D. 羟基脲
- E. 6-硫代鸟嘌呤

129.下列哪项不是引起空腹高血糖的原因

- A. 夜间胰岛素剂量不足
- B. 早餐进食过多
- C. Somogyi 现象
- D. 黎明现象

130.男，55 岁，糖尿病，饮酒后昏迷一天入院。查：血压 70/50mmHg，血糖 16.7mmol/L，血钠 155mmol/L，血钾 4.1mmol/L， HCO_3^- 6 mmol/L，尿糖（+++），酮体（++）。下列治疗哪项正确

- A. 小剂量胰岛素、低渗盐水、补钾
- B. 小剂量胰岛素、等渗盐水、补碱
- C. 大剂量胰岛素、低渗盐水、补钾
- D. 大剂量胰岛素、等渗盐水、补钾

131.牵涉痛的特点不包括

- A. 定位明确
- B. 疼痛剧烈
- C. 随体位变化而加重
- D. 有压痛、肌紧张

132.关于体位与疾病关系的叙述，错误的是

- A. 心绞痛——强迫坐位
- B. 肾绞痛——辗转体位
- C. 胆绞痛——辗转体位
- D. 发绀型先心病——强迫蹲位

133.长期使用广谱抗菌药的患者体检时常发现

- A. 地图舌
- B. 草莓舌
- C. 毛舌
- D. 镜面舌

134.关于腹部外形临床意义的叙述，错误的是

- A. 蛙腹——少量腹腔积液
- B. 舟状腹——严重脱水
- C. 尖腹——结核性腹膜炎
- D. 气腹——胃肠穿孔

135.右下腹触及包块，不易推动，压痛明显，无囊性感，应首先考虑

- A. 恶性肿瘤
- B. 炎性包块
- C. 血吸虫肉芽肿
- D. 回盲部结核

136.梨形心脏见于

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄

- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 三尖瓣狭窄

137. 奇脉见于

- A. 右心功能不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 高血压
- D. 大量心包积液

138. 双肺满布湿啰音多见于

- A. 肺结核空洞
- B. 支气管扩张
- C. 支气管肺炎
- D. 急性肺水肿

139. 提示左心功能不全的脉搏是

- A. 奇脉
- B. 迟脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉

140. 按风湿性疾病的分类，不属于弥漫性结缔组织病的是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 类风湿性关节炎
- C. 风湿热
- D. 系统性硬化病

141. 女性，20岁，类风湿关节炎患者，其临床特征有下列几项，哪一项不是

- A. 近端指间关节肿痛
- B. 远端指间关节肿痛
- C. 掌指关节肿痛
- D. 腕关节肿痛

142. 心脏听诊，听到“大炮音”应考虑

- A. 二尖瓣狭窄
- B. P-R 间期缩短
- C. 运动或发热
- D. 完全性房室传导阻滞

143. 胸部触诊语音震颤减弱的是

- A. 肺脓肿
- B. 肺梗死
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 空洞型肺结核

144. 因肺结核引起的支气管扩张，湿啰音最常见的部位是

- A. 肺底部
- B. 肺尖部
- C. 腋窝部
- D. 肩胛间区

145. 主动脉瓣反流时心尖部可存在

- A. Graham-Steell 杂音
- B. Austin-Flint 杂音
- C. Duroziez 征
- D. Traube 征

146. 下列关于嗜铬细胞瘤病人的代谢紊乱，错误的是

- A. 基础代谢率可增高
- B. 血糖增高
- C. 血游离脂肪酸增高

- D. 血钾可增高
- E. 血钙可增高

147. 下列选项中, 不属于抗 ENA 抗体的是

- A. 抗 Sm 抗体升高
- B. 抗 RNP 抗体
- C. 抗 SSA 抗体
- D. 抗 rRNP 抗体
- E. 抗 dsDNA 抗体

148. 下列哪项指标可提示有早期小气道病变存在

- A. 弥散功能
- B. 潮气量
- C. 流速容量曲线
- D. 最大通气量
- E. 肺泡通气量

149. 慢性支气管炎病人长期咳脓性痰合并以下哪种疾病较为多见

- A. 支气管哮喘
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 鼻窦病变伴支气管扩张
- D. 活动性肺结核
- E. 肺囊肿

150. 关于阻塞性肺气肿, 哪一项描述是正确的

- A. 经积极治疗可以痊愈
- B. 其病理改变是不可逆的
- C. 仅限于肺泡弹性减退与膨胀
- D. α_1 抗胰蛋白酶增加易发生肺气肿
- E. 肺功能改变主要是肺活量减少

151. 慢性支气管炎并发肺气肿早期病理生理改变, 下列哪项错误

- A. 病变局限于细小气道
- B. 最大通气量降低
- C. 闭合容积增大
- D. 动态肺顺应性降低
- E. 静态肺顺应性增加

152. 阻塞性肺气肿支气管炎型的临床表现, 下列哪项是正确的

- A. 发病年龄较轻
- B. 多无发绀
- C. 喘息明显, 多呈持续性
- D. X 线胸片呈肺纹理减少
- E. 静息时 PaO_2 轻度降低

153. 慢性肺心病心功能代偿期除了有 COPD 的临床表现外, 还可有的体征是

- A. 肝颈静脉反流征阳性
- B. 剑突下心脏收缩期搏动
- C. 舒张期奔马律
- D. 腹腔积液征

154. 肺心病患者高度水肿 PaCO_2 7.98kPa(60mmHg), 心率 114 次/分, 下列哪种治疗较为合理

- A. 洋地黄化, 并用少量镇静剂
- B. 毒毛旋花子甙 K 静注, 并用醋氮唑酰胺
- C. 毛花苷 C 静注, 并用普萘洛尔
- D. 洋地黄化, 并用地塞米松
- E. 毒毛旋花子甙 K 静注, 临时使用少量利尿剂

155. 肺心病患者, 在人工通气时, 做血气分析, pH 7.51, PaCO_2 24mmHg. BE-8.0mmEq/l, 下一步应采用

- A. 精氨酸
- B. 减少呼吸机潮气量
- C. 5%NaHCO₃
- D. 加大呼吸机潮气量
- E. 立即停用呼吸机

156.危重症哮喘患者的临床表现，下列哪项不正确

- A. 呈现腹式呼吸
- B. 双肺哮鸣音响亮
- C. 血压下降
- D. 无奇脉
- E. 意识模糊

157.对支气管哮喘急性发作病人进行血气分析，其中 PaCO₂ 增高提示

- A. 病情好转
- B. 出现呼吸性碱中毒
- C. 病情恶化
- D. 出现心力衰竭
- E. 无临床意义

158.下列药物中，属于治疗支气管哮喘患者的β受体激动剂是

- A. 氨茶碱
- B. 异丙托溴铵
- C. 色苷酸钠
- D. 沙丁胺醇

159.尿蛋白在 (+++) 以上，应考虑为

- A. 肾小球疾病
- B. 肾小管疾病
- C. 肾间质疾病
- D. 肾血管疾病
- E. 肾脏感染

160.再生障碍性贫血的诊断，下列哪一项不正确

- A. 发热、出血、贫血
- B. 一般无肝脾和淋巴结肿大
- C. 中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率和积分减低
- D. 骨髓可呈灶性增生，但巨核细胞减少
- E. 末梢血淋巴细胞比例数增高

二、A2 型题 (答题说明：案例摘要型最佳选择题。每一道考题是一个案例摘要，其下面均有 4-5 个备选答案，在答题时，只需从中选择一个最合适的答案，并在答题纸上标清题号和选项，以示正确回答。共有 13 题，每题 2 分，合计 26 分。)

1. 一名 25 岁消防队员，体重 65kg，在救火中不幸烧伤了面部、双上肢、躯干前方和会阴部。对该患者第一个 24 小时应补充的液体总量约是

- A. 3500ml
- B. 4600ml
- C. 5000ml
- D. 5500ml

2.一位患者输血 40ml 时发生寒战、发热、呼吸困难、腰痛等症状通常提示

- A. 溶血性输血反应
- B. 发热性反应
- C. 血液污染
- D. 变态反应

E. 枸橼酸盐的毒性

3.腹膜炎患者，经扩容治疗血压 80/60mmHg，中心静脉压 5cm 水柱，尿量 20ml/h，应考虑

- A. 急性肾衰竭
- B. 呼吸困难综合征
- C. 低血容量性休克
- D. 急性心力衰竭
- E. 感染未控制

4.患者，男，45 岁。4 小时前感上腹部胀痛伴恶心，呕吐一次为胃内容物，1 小时来右侧腹痛，有便意但未能排便，疑似急性阑尾炎。下列体征中，对确诊最有价值的是

- A. 体温 37.8℃
- B. McBurney 点压痛
- C. 腰大肌征阳性
- D. Rovsing 征阳性

5.男性，40 岁，血吸虫性肝硬化伴严重脾大及血小板减少，有上消化道出血史，胃镜示食管静脉曲张。该患者的最佳治疗方面是

- A. 单纯脾切除术
- B. 门腔静脉分流术
- C. 脾肾静脉分流术
- D. 脾切除加贲门周围血管离断术
- E. 曲张静脉套扎术

6.男性，25 岁，节律性间断上腹隐痛 3 年，加重 2 天，10 小时前开始黑便 3 次，量约 1000 g 左右，P120 次/分，Hb90 g/L，首选下列哪种治疗

- A. 大量输液
- B. 输右旋糖酐
- C. 外科手术
- D. 急诊内镜止血
- E. 输血、补液

7.患者，男，58 岁。因疲劳后突发心悸，呼吸困难，咳嗽，咳泡沫血痰而来院急诊。既往有高血压病，心肌梗死史。查体：血压 90/60mmHg，端坐位，喘息状，口唇发绀，双肺满布中小水泡音，心率 140 次/分，心音听不清。下列急诊处理中，不正确的是

- A. 高流量吸氧
- B. 选用中枢交感神经抑制剂
- C. 选用短效 β 受体抑制剂
- D. 应用外周动静脉血管扩张剂

8.肺心病呼吸衰竭患者行气管切开辅助呼吸后，检查血气为 PaO_2 75mmHg；血 pH7.42， PaCO_2 28.5mmHg，BE-5.2mmol/L， HCO_3^- 18.3mmol/L。你考虑是

- A. 正常
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 呼吸性酸中毒(代偿)
- E. 代谢性酸中毒伴有呼吸性碱中毒(代偿)

9.男性，68 岁，高热三天伴咳嗽胸痛，多量黄绿色胶性痰；白细胞总数 $20 \times 10^9/\text{L}$ 。X 线示中下肺实变，其间有不规则透亮区，叶间隙下坠，伴少量胸腔积液。可能的诊断为

- A. 肺炎球菌性肺炎
- B. 肺结核（干酪样性肺炎）
- C. 克雷白杆菌肺炎
- D. 肺曲菌病
- E. 绿脓杆菌性肺炎

10.男性,60岁,因3年来渐进性加重的活动后心悸,气短,无心前区疼痛,半年来不能平卧,伴下肢浮肿,腹胀,尿少来诊,30年前曾有高血压,未治疗。无关节痛史,吸烟40年。查体:血压148/90mmHg,半卧位,颈静脉明显充盈,测肺底均可闻及水泡音,心界明显向左扩大,心尖部可闻3/6级收缩期吹风样杂音,心律整,心率103次/分,S1减弱,肝肋下2.0cm,肝颈反流征(+),双下肢水肿(+)

根据上述临床资料分析,可基本排除的诊断是

- A. 风湿性心脏瓣膜病
- B. 冠心病
- C. 高血压病
- D. 扩张型心肌病

11.患者,男,40岁,腹胀、纳差3个月,颈部有两个蜘蛛痣,肝肋下4厘米,质硬,腹水中抽出淡红色腹水少许,比重1.013。诊断可能是

- A. 肝硬化
- B. 门静脉血栓形成
- C. 结核性腹膜炎
- D. 原发性肝癌
- E. 胰源性腹水

12.女性,60岁,慢性咳喘18年,加重1周,血气分析结果如下:pH 7.35, PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 75mmHg, AB 4.2mmol/L, K⁺ 2.8mmol/L, Cl⁻ 80mmol/L。考虑诊断为

- A. 代谢性酸中毒失代偿
- B. 呼吸性酸中毒失代偿
- C. 呼吸性酸中毒伴代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒伴代谢性碱中毒

13.男性,55岁,因肾病综合征(病理为膜性肾病)入院治疗,在应用利尿剂和糖皮质激素的治疗过程中突然持续性腰痛,尿量减少,下肢水肿加重,蛋白尿显著增多伴肉眼血尿,血肌酐较前增高,B超示双肾较前增大。最可能的原因是

- A. 原有肾病加重
- B. 肾静脉血栓形成
- C. 伴发泌尿系感染
- D. 伴发泌尿系肿瘤

三、A3型题(答题说明:该题型提供若干个题干或答案,每个共用题干及答案下设若干道考题。请根据所提供的信息,在4-5个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题纸上标清题号和选项,以示正确回答。共有7题,每题2分,合计14分。)

14-16题共用题干:

男,35岁,右腹股沟肿块10年,站立时明显,平卧时消失,有时可降至阴囊,体检;右腹股沟肿块,拳头大小可回纳入腹腔,外环容3指,压迫内环后肿块不突出。

14.该患者最可能的诊断是

- A. 精索鞘膜积液
- B. 精索静脉曲张
- C. 腹股沟直疝
- D. 腹股沟斜疝

15.该患者最佳手术方式为。

- A. 疝囊高位结扎
- B. 紧缩内环

- C. 疝前壁修补术
- D. 疝囊高位结扎+紧缩内环+疝后壁修补术

16. 术后参加体力劳动的时间是术后

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月

17-18 题共用题干：

男，30 岁，因溃疡病大出血，输入库存血 1500ml，发现呼吸深快，有烂苹果味，皮肤青紫，血压 90/75mmHg (12/10kPa)，实验检查血清钾 7.0mmol/L，血清钠 135mmol/L，动脉血 pH7.2，血浆 HCO_3^- 17mmol/L。

17. 该患者电解质失衡诊断为

- A. 低钾血症
- B. 低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 高钙血症

18. 该患者酸碱失衡为

- A. 代谢性碱中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒
- D. 呼吸性酸中毒

19-20 题共用答案：

- A. 肝肿瘤
- B. 甲状腺肿瘤
- C. 大肠癌
- D. 骨肿瘤
- E. 脑肿瘤

19. 放射性核素显像检查诊断阳性率较高的是

20. 放射性核素显像检查诊断阳性率较低的是

四、不定项选择题 (请根据所提供的信息，在备选答案中选择合适答案，并在答题纸上标清题号和选项，以示正确回答。共有 10 题，每题 2 分，合计 20 分。)

21. «医疗机构从业人员行为规范»中“以人为本,践行宗旨”的具体要求包括

- A. 发扬人道主义精神
- B. 发扬大医精诚理念
- C. 坚持救死扶伤,防病治病的宗旨
- D. 积极维护社会公益,促进人类健康

22. 医患关系的本质特征不包括

- A. 具有契约性质的信托关系
- B. 具有买卖性质的依附关系

- C. 具有协作性质的买卖关系
- D. 具有依附性质的非平等关系

23. 下列选项中,不符合手术治疗伦理要求的是

- A. 患者充分信任时,医生可自行决定手术方案
- B. 患者坚决要求而无指征的手术也可实施
- C. 手术方案应当经患方知情同意
- D. 手术对患者确实有益时,可无需患者知情同意

24. 患者的道德权利包括:

- A. 基本医疗权
- B. 疾病知情权
- C. 免除一定的社会责任权
- D. 保护隐私权

25. 医患沟通中的非言语沟通形式包括

- A. 身段姿态
- B. 人际距离
- C. 面部表情
- D. 引导话题

26. 某女性患者因妊娠异常行剖宫产术, 经治医师在告知患者和家属手术相关信息并取得签字后实施手术。胎儿被取出后发现产妇患有右侧卵巢畸胎瘤, 遂告知其丈夫并建议切除卵巢, 其丈夫立即打电话与其他家属商议, 医师在尚未得到家属商议结果的情况下继续手术并切除右侧卵巢, 于是发生医患纠纷。此案例中, 医师侵犯的患方权利是

- A. 疾病认知权
- B. 知情同意权
- C. 隐私保护权
- D. 生命权

27. 医学伦理学尊重原则是

- A. 公平分配卫生资源
- B. 尊重病人及家属的自主性或决定
- C. 尊重病人的知情同意权
- D. 医务人员的引导权

28. 在病史采集结束时, 一位医生这样对患者说: “接下来我们要做体格检查, 之后我们坐下来讨论你出现症状的可能原因, 再共同制定计划。” 这位医生采用了病史采集的哪项技能?

- A. 询问就诊原因
- B. 问明患者的全部意向
- C. 核对病史内容
- D. 与患者建立伙伴关系

29. 尊重病人的自主权, 不包括

- A. 当患者的自主选择与他人、社会利益发生冲突时, 主要履行对患者的义务
- B. 当患者的自主选择有可能危及生命时劝导病人做出最佳选择
- C. 提供正确、易于理解、适量、有利于增强病人信心的信息
- D. 尊重病人的所有决定

30. 广义上，医患关系中的“患”指

A.患者

B.患者亲属

C.患者监护人

D.患者单位组织