

Herbario docente MA-UAM

Sorbus torminalis (L.) Crantz

ROSACEAE

Sinónimos: *Torminalis glaberrima* (Gand.) Sennikov & Kurtto

Nombres vernáculos: Mostajo, Peral de monte



Reproducción: Monoico

Hoja: Simple



Filotaxis: Alterna

Hábito: Caducifolio

Descripción:

Biotipo: Árbol. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito). Árbol de hasta 20 m. con copa redondeada o aplanada, ramillas pardo-rojizas con lentejillas blanquecinas. Hojas alternas, simples, pecioladas, aovadas (5-9 cm) hendidas profundamente en 5-9 lóbulos, margen aserrado, más pálido por el envés. Flor blanca (1 cm) con 5 pétalos. Fruto ovoideo pardo (12-18 mm) en pomo, con 5 dientecillos en el cáliz.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Submediterránea

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-1200 m

Piso bioclimático: Supramediterráneo, Montano

Usos:

Fruto áspero y astringente usado en medicina popular para tratar diarreas. La madera se usa en carpintería y tornería. Se cultiva como ornamental.