

Herbario docente MA-UAM

Fraxinus angustifolia Vahl

OLEACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Fresno





Reproducción: Monoico
Hoja: Pinnaticompuesta

Filotaxis: Opuesta
Hábito: Caducifolio

Descripción:

Biotipo: Árbol. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito). Árbol de tamaño medio hasta 15 (20) m. Tronco corto y grueso, caducifolio. Hojas opuestas e imparipinnadas, pecioladas, con (3) 5-13 folíolos lanceolados y aserrados, glabros (lampiños). Flores precoces (pues se desarrollan mucho antes que las hojas), formando ramilletes opuestos. Carecen de sépalos y pétalos. Fruto tipo sámara aplastada que permanece casi todo el invierno en el árbol.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Mediterránea, Submediterránea

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-1500 (1800) m

Piso bioclimático: Mesomediterráneo, Supramediterráneo

Usos:

Ornamental. Madera resistente y elástica. Excelente leña y carbón. Ramón como alimento para el ganado. Hojas diuréticas y antirreumáticas. También son laxantes. En infusión, contra la artritis y la gota.