

Herbario docente MA-UAM

Sorbus aria (L.) Crantz

ROSACEAE

Sinónimos: *Aria edulis* (Willd.) M.Roem.

Nombres vernáculos: Mostajo, Serbal, Moohera



Reproducción: Monoico

Hoja: Simple


Filotaxis: Alterna

Hábito: Caducifolio

Descripción:

Biotipo: Árbol. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito). Árbol de hasta 25 m, con copa ancha, corteza lisa y gris. Hojas alternas, simples, pecioladas, ovales o elípticas, pecioladas, aserradas, verdes, rugosas por el haz y tomentosas por el envés. De 10 a 14 pares de nervios laterales. Flores blancas (10-15 cm) en corimbos terminales. Fruto pomo rojo, ácido y harinoso. Floración abril-mayo. Fruto septiembre-octubre. Apomictia frecuente. Polinización entomófila y dispersión ornitócora.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Eurosiberiana

Preferencia edáfica: Basófilo

Elevación: (500) 800-1800 (2200) m

Piso bioclimático: Montano, Subalpino, Supramediterráneo

Usos:

Ornamental, medicinal (expectorante, antiescorbútico, purgente, diurético). Madera clara y muy lisa, difícil de trabajar. Buen combustible. Alimento para las aves en invierno.