

Herbario docente MA-UAM

Salix atrocinerea Brot.

SALICACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Bardaguera, Sarga, Salguera





Reproducción: Dioico
Hoja: Simple

Filotaxis: Alterna
Hábito: Caducifolio

Descripción:

Biotipo: Arbolillo, arbusto. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (microfanerófito). Arbusto alto o árbol, de unos 7 m de alto. Las hojas son oblongo-transovadas o elípticas, de 2-10 x 1 cm. Son glabras por el haz, con pelos retorcidos y rojizos o blancos; por el envés pueden ser glabras o pubescentes. De 7 a 14 pares de nervios laterales primarios, base redondeada o cuneiforme. Pecíolo peloso y con base ensanchada. Hojas alternas con estípulas no caducas. Ramas poco densas y alargadas, con brotes pubescentes. La madera descortezada con estrías longitudinales. Los amentos son alternos, sésiles y con brácteas pequeñas. Cada flor tiene un nectario, en las femeninas, con estilo corto y estigmas enteros o bífidos. Las masculinas con dos estambres filamentosos libres y pelosos, anteras amarillas. Florece de enero a marzo y maduran las semillas antes del verano.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Eurosiberiana, Mediterránea

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-2000 m

Piso bioclimático: Termomediterráneo, Mesomediterráneo, Supramediterráneo, Colino, Montano, Subalpino

Usos:

-