



Herbario docente MA-UAM

Retama monosperma (L.) Boiss.

FABACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Retama blanca, Piorno blanco

Reproducción: Monoico Filotaxis: Alterna Hoja: Simple Hábito: -



Biotipo: Arbusto. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (nanofanerófito). Arbusto de 1 a 3 m con ramas flexibles, verdes y estriadas, ramillas colgantes, al principio sedosas. Hojas estrechas y alargadas, sedosas en el envés, que permanecen poco tiempo en las ramas. Flores blancas de 9 a 12 mm en racimos laterales cortos y con pocas flores. Cáliz acampanado, a menudo púrpura. Estandarte sedoso en el dorso, más largo que la quilla. Legumbre de 14 a 18 mm abovada o redondeada, acabada en punta con 1 o 2 semillas inmóviles.

Distribución:





Ecología:

Región biogeográfica: Endémica, Mediterránea

Preferencia edáfica: Acidófilo

Elevación: 0-300 m

Piso bioclimático: Termomediterráno

Usos:

Actualmente se emplea como planta ornamental en jardines, carreteras. Esto está propiciando su asilvestramiento en algunas zonas que le son favorables.

