

Herbario docente MA-UAM

Fraxinus ornus L.

OLEACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Fresno de flor, Fresno de olor




Reproducción: Monoico
Hoja: Pinnaticompuesta

Filotaxis: Opuesta
Hábito: Caducifolio

Descripción:

Biotipo: Árbol. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito). Árbol de copa amplia y corteza lisa, grisácea. Puede llegar a alcanzar una altura de 20 m. Hojas opuestas pinnaticompuestas formadas por 5 a 9 folíolos. Las flores nacen al mismo tiempo que las hojas o una vez formadas estas poseen un olor muy penetrante. El fruto tipo ámara (seco y alado). Florece en primavera (abril-mayo), madurando los frutos a finales de verano.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Submediterránea

Preferencia edáfica: Basófilo

Elevación: 0-1500

Piso bioclimático: Mesomediterráneo, Supramediterráneo

Usos:

En Italia y en Sicilia del fresno de olor se obtiene el "manná", resina azucarada apreciada como laxante; para ello se sangra el árbol durante el verano y se recoge el exudado. Las semillas se han utilizado en Egipto como condimento, donde eran conocidas como "lengua de pájaro"