

## Herbario docente MA-UAM

*Fraxinus ornus* L.

OLEACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Fresno de flor, Fresno de olor



Reproducción: Monoico

Hoja: Pinnaticompuesta


Filotaxis: Opuesta

Hábito: Caducifolio

### Descripción:

Es un árbol de copa amplia y corteza lisa, grisácea. Puede llegar a alcanzar una altura de 20 m. De hojas caducas nacen enfrentadas en ramillas, formadas por 5 a 9 folíolos. Las flores nacen al mismo tiempo que las hojas o una vez formadas estas poseen un olor muy penetrante. El fruto es seco y alado. Florece en primavera (abril-mayo), madurando los frutos a finales de verano. Se cría en umbrías de montañas de clima suave tanto en invierno como en verano. Aparece también en los sotos de los ríos.

### Distribución:



### Ecología:

Biotipo: Árbol, biotipo Raunkier: Fanerófito (mesofanerófito)

Preferencia edáfica: Basófilo

Elevación: -

Piso bioclimático: -

### Usos:

En Italia y en Sicilia del fresno de olor se obtiene el "manná", resina azucarada apreciada como laxante; para ello se sangra el árbol durante el verano y se recoge el exudado. Las semillas se han utilizado en Egipto como condimento, donde eran conocidas como "lengua de pájaro"

Lugar de colección: Parque del Retiro, Madrid

Fecha de colección: 1995-04-16