

## Herbario docente MA-UAM

*Salix atrocinerea* Brot.

SALICACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Bardaguera, Sarga, Salguera





Reproducción: Dioico  
Hoja: Simple

Filotaxis: Alterna  
Hábito: Caducifolio

## Descripción:

Arbusto alto o árbol, de unos 7 m de alto. Las hojas son oblongo-transovadas o elípticas, de 2 a 10 cm de largo por 1 cm de ancho, raras veces más. Son glabras por el haz, con pelos retorcidos y rojizos o blancos; por el envés también pueden ser glabras o pubescentes. De 7 a 14 pares de nervios laterales primarios, ápice agudo u obtuso y base redondeada o cuneiforme. Pecíolo peloso y con base ensanchada. Hojas alternas con estípulas no caducas. Ramas poco densas y alargadas, con brotes pubescentes. La madera descortezada tiene muchas estrías longitudinales. Los amentos son alternos en las ramas, sésiles y con brácteas pequeñas. Cada flor sólo tiene un nectario, en las femeninas, con estilo corto y estigmas enteros o bífidos. Las masculinas con dos estambres filamentos libres y pelosos, anteras amarillas. Florece de enero a marzo y maduran las semillas antes del verano.

## Distribución:



## Ecología:

Biotipo: Arbolillo, arbusto, biotipo Raunkier: Fanerófito (microfanerófito)

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: -

Piso bioclimático: Ripario, Subalpino

## Usos:

-