

Herbario docente MA-UAM

Chamaerops humilis L.

ARECACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Palmito



Reproducción: Monoico

Hoja: Simple



Filotaxis: Alterna

Hábito: Perennifolio

Descripción:

Biotipo: Arbusto. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (nanofanerófito). Dioica. Multiplicación vegetativa. No supera generalmente el metro de altura aunque puede llegar hasta los 4 m en ciertas localidades. Tronco fibroso, cubierto de restos foliares. Hojas palmatisectas, coriáceas, de hasta 90 cm de largo. Peciolos largos y espinosos con vaina fibrosa. Flores en espádices pedunculadas con espatas coriáceas de margen piloso. Flor amarilla. Los frutos son drupas (dátiles) pardorojizas de 1-4 cm.

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Mediterránea

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-1000 m en la P. Ibérica

Piso bioclimático: Termomediterráneo

Usos:

Muy rico en taninos. Antiguamente se utilizaba como antidiarréico y sus raíces se vendían como zarzaparrilla. No tiene usos medicinales. Actualmente se recolectan los cogollos tiernos para su uso comestible ("palmitos") y como ornamental. En Marruecos las hojas se utilizan para cordelería. En el pasado en España se utilizaba para cestería.