



Herbario docente MA-UAM

Rubus ulmifolius Schott

ROSACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Zarzamora

Reproducción: Monoico Filotaxis: Alterna Hoja: Palmaticompuesta Hábito: Caducifolio



Biotipo: Arbusto. Biotipo de Raunkier: Fanerófito (nanofanerófito). Arbusto sarmentoso impenetrable, de hasta 2-3 m. Tallos (turiones o vástagos) muy largos, con fuertes aguijones (acúleos). Hojas alternas, palmaticompuestas, formadas por 3-5 foliolos, muy blancos por el envés. Flores blancas o sonrosadas en racimos terminales. Fruto tipo polidrupa (formado por drupitas agrupadas en cabezuela globosa).

Distribución:



Ecología:

Región biogeográfica: Plurirregional Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-1500 m

Piso bioclimático: Termomediterráneo, Mesomediterráneo, Supramediterráneo, Colino, Montano

Usos:

Las moras son comestibles y con ellas se hacen confituras. Tambien para teñir la lana, dar color a los vinos, preparar bebidas alcoholicas y como medicinales por su caracter astringente. Para esto se susan los brotes tiernos. Los tallos para hacer cestos.

