



Herbario docente MA-UAM

Calluna vulgaris (L.) Hull

ERICACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Brecina, Brezo común

Reproducción: Monoico Filotaxis: Opuesta Hoja: Simple Hábito: Perennifolio




Descripción:

Subarbusto perennifolio muy ramificado y generalmente lampiño. Hojas diminutas (2-3.5 mm), opuestas, sésiles y con dos espolones en su base; semejan escamas empizarradas. Flores lilas o rosado-lilacinas pequeñas en racimos terminales (3-4 mm). Cáliz coloreado con cuatro sépalos alargados que envuelven la corola, más corta y con cuatro lóbulos, en cuyo interior lleva ocho estambres. Fruto es una cápsula redondeada con cuatro valvas, rodeada por la corola.

Distribución:





Ecología:

Biotipo: Mata, biotipo Raunkier: Caméfito Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-2600 m

Piso bioclimático: Colino - Alpino

Usos:

Importante en economía de pueblos septentrionales; se utiliza como combustible, aislante, lecho de animales, para techar y teñir y también como forraje para ganado y como planta melífera para las abejas. Se usa también para hacer escobas, brochas, cestas y sogas.