

Herbario docente MA-UAM

Phillyrea latifolia L.

OLEACEAE

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Labiérnago, Aladern





Reproducción: Monoico
Hoja: Simple

Filotaxis: Opuesta
Hábito: Perennifolio

Descripción:

Arbusto termófilo (más exigente en humedad que *P. an gustifolia*), que puede presentar porte arbóreo (por ejemplo en Sierra de Arrábida, Mata do Solitario). Aparece en quejigares (*Q. faginea* subsp. *broteroi* y *Q. canariensis*), alcornocales, madroñales y encinares. Puede alcanzar los 6-8 m de altura. Hojas opuestas, perennes, ovadas u ovado-lanceoladas o elipsoidales, correosas. Flores axilares en cortos ramilletes, diminutas, blanco-verdosas, cuatro pétalos soldados en la base. El fruto carnoso es una drupa globosa de tamaño algo menor que un guisante. *Phillyrea angustifolia* es un taxon similar, pero tiene hojas verde claro en el haz, largas, linear-lanceoladas, y con el margen no aserrado.

Distribución:



Ecología:

Biotipo: Arbolillo, arbusto, biotipo Raunkier: Fanerófito (microfanerófito)

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: <1000 m

Piso bioclimático: Termomediterráneo y Mesomediterráneo, con ombroclima subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo.

Usos:

Madera muy estimada para quemar en hornos (por ejemplo alfarería); carbón excelente; hojas y frutos astringentes y refrigerantes; tratamiento de úlceras e inflamaciones bucales.

Lugar de colección: Sierra del Aljibe, Cádiz.

Fecha de colección: 1984-06-03