

Herbario docente MA-UAM

Chamaerops humilis L.

ARECACEAS

Sinónimos: -

Nombres vernáculos: Palmito





Reproducción: Monoico
Hoja: Simple

Filotaxis: Alterna
Hábito: Perennifolio

Descripción:

Dioica. Multiplicación vegetativa. No supera generalmente el metro de altura aunque pueden llegar hasta los 4 m en ciertas localidades. Tronco fibroso, cubierto de restos foliares. Hojas palmatisectas, coriáceas, de hasta 90 cm de largo. Pecíolos largos y espinosos con vaina fibrosa. Flores espádices pedunculadas con espatas coriáceas de margen piloso. Flor amarilla. Los frutos son drupas (dátiles) pardorojizas de 1-4 cm. Dispersión endozoocora.

Distribución:



Ecología:

Biotipo: Arbusto, biotipo Raunkier: Fanerófito (nanofanerófito)

Preferencia edáfica: Indiferente edáfico

Elevación: 0-1000 m en la P. Ibérica

Piso bioclimático: Termomediterráneo

Usos:

Muy rico en taninos. Antiguamente se utilizaba como antidiarréico y sus raíces se vendían como zarzaparrilla. No se le atribuyen usos o propiedades medicinales. Actualmente se recolectan los cogollos tiernos para su uso comestible (llamados "palmitos") y como ornamental. En Marruecos las hojas se utilizan para cordelería. En el pasado aquí se utilizaba para cestería.

Lugar de colección: Bétera (Valencia)

Fecha de colección: 1993-03-20

Paneles de flora - Unidad de Botánica - Departamento de Biología UAM