

# Formelsammlung Robotik

## Vektoren

Skalare Multipl.	$\lambda \cdot \vec{a}$	$\begin{pmatrix} \lambda \cdot a_1 \\ \lambda \cdot a_2 \\ \lambda \cdot a_3 \end{pmatrix}$
Abstand P.-Urpsr. Betrag (Norm)	$  \vec{a}  $	$ \vec{a}  = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$
Skalarprodukt	$\vec{a} \cdot \vec{b}$	$a_1 \cdot b_1 + \dots + a_n \cdot b_n = x$
Winkel		$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a}  \cdot  \vec{b} }$

## Matrizen

Gleich	$A = B$	$(a_{ij}) = (b_{ij})$
Addition	$C = A + B$	$(c_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij})$
Differenz	$C = A - B$	$(c_{ij}) = (a_{ij}) - (b_{ij})$
Multiplikation Skalar	$c \cdot A$	$cA \in R^{m \times n}$
Multiplikation Matrizen	$A \cdot B$	$AB = \sum_j a_{ij}b_{ij}$


### Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

## Rechte Hand Regel



## Koordinatensysteme

Objekt in 3D (OKS)	$\vec{v} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$	$\alpha, \beta, \gamma = \text{Drehwinkel}$
Senkrechte		

## Rotationsmatrizen

Rotation um X	$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Rotation um Y	$R_y(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Rotation um Z	$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Vormultipl. (Roll-pitch-yaw)	Rotation um die ursprüngliche (feste) Achse. Schreibweise: Letzte Drehung $\rightarrow$ 1. Drehung
Nachmultipl. (Euler-Winkel)	Rotation um die neuen (momentanen) Achsen. Schreibweise: 1. Drehung $\rightarrow$ Letzte Drehung
Homogene 4 $\times$ 4-Matrix	$\begin{pmatrix} R_{3 \times 3} & u_{3 \times 1} \\ f_{1 \times 3} = 0 & 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_{x \downarrow z} & o_{x \downarrow z} & a_{x \downarrow z} & u_{x \downarrow z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Invertierung 4 $\times$ 4	$T^{-1} = \begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z & -n^T \cdot \vec{u} \\ o_x & o_y & o_z & -o^T \cdot \vec{u} \\ a_x & a_y & a_z & -a^T \cdot \vec{u} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Verkettete Lagebeschr.	${}^{BKS}H_B = {}^{BKS}H_A \cdot {}^A H_B$ (H = Homo. Matr.)

## Quaternionen

$$a, b, c, d \in \square \text{Quaternion } q \Rightarrow q = a + b \cdot i + c \cdot *j + d \cdot k$$

$$a \in \mathbb{R}, u = (b, c, d)^T \in \mathbb{I}$$

$$q = (a, b, c, d)^T \text{ bzw. } q = (a, u)^T$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$ij = -ji = k$$

$$jk = -kj = i$$

$$ki = -ik = j$$

Gegeben	$q = (a_q, u_q), r = (a_r, u_r)$
Addition	$q + r = (a_q + a_r, u_q + u_r)$
Skalar	$q \cdot r = a_q a_r + \langle u_q, u_r \rangle = a_q a_r + b_q b_r + c_q c_r + d_q d_r$
quatern. Multipl.	$q * r = (a_q + i \cdot b_q + j \cdot c_q + k \cdot d_q) \cdot (a_r + i \cdot b_r + j \cdot c_r + k \cdot d_r)$
konjugiert	$q^* = (a_q, -u_r)$
Norm	$ q  = \sqrt{qq^*} = \sqrt{q^* q} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$
inverses Element	$q^{-1} = \frac{q^*}{ q ^2}$

### Rotation mit Quaternionen

Vektor als Quaternion	$p = (x, y, z)^T \Rightarrow q = (0, p)^T$
Skalar als Quaternion	$s \Rightarrow q = (s, 0)^T$
Einheitsquaternion	$ q  = 1$
Rotation um $\theta$ , Achse $u$	$q = (\cos(\frac{\theta}{2}), u \cdot \sin(\frac{\theta}{2}))$
Rotation Punkt $v$	$v' = qvq^* = qvq^{-1}$