

Formelsammlung Robotik

Vektoren

Skalare Multipl.	$\lambda \cdot \vec{a}$	$\begin{pmatrix} \lambda \cdot a_1 \\ \lambda \cdot a_2 \\ \lambda \cdot a_3 \end{pmatrix}$
Abstand P.-Urpsr. Betrag (Norm)	$ \vec{a} $	$ \vec{a} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$
Skalarprodukt	$\vec{a} \cdot \vec{b}$	$a_1 \cdot b_1 + \dots + a_n \cdot b_n = x$
Winkel		$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \cdot \vec{b} }$


Matrizen

Gleich	$A = B$	$(a_{ij}) = (b_{ij})$
Addition	$C = A + B$	$(c_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij})$
Differenz	$C = A - B$	$(c_{ij}) = (a_{ij}) - (b_{ij})$
Multiplikation Skalar	$c \cdot A$	$cA \in R^{m \times n}$
Multiplikation Matrizen	$A \cdot B$	$AB = \sum_j a_{ij} b_{ij}$

Multiplikation

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

Rechte Hand Regel



Koordinatensysteme

Objekt in 3D (OKS)	$\vec{v} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$	$\alpha, \beta, \gamma = \text{Drehwinkel}$
Senkrechte		

Rotationsmatrizen

Rotation um X	$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Rotation um Y	$R_y(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Rotation um Z	$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$
Vormultipl. (Roll-pitch-yaw)	Rotation um die ursprüngliche (feste) Achse. Schreibweise: Letzte Drehung \rightarrow 1. Drehung
Nachmultipl. (Euler-Winkel)	Rotation um die neuen (momentanen) Achsen. Schreibweise: 1. Drehung \rightarrow Letzte Drehung
Homogene 4 \times 4-Matrix	$\begin{pmatrix} R_{3 \times 3} & u_{3 \times 1} \\ f_{1 \times 3} = 0 & 1 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_{x \downarrow z} & o_{x \downarrow z} & a_{x \downarrow z} & u_{x \downarrow z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Invertierung 4 \times 4	$T^{-1} = \begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z & -n^T \cdot \vec{u} \\ o_x & o_y & o_z & -o^T \cdot \vec{u} \\ a_x & a_y & a_z & -a^T \cdot \vec{u} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Verkettete Lagebeschr.	${}^{BKS}H_B = {}^{BKS}H_A \cdot {}^A H_B$ (H = Homo. Matr.)

Quaternionen

$a, b, c, d \in \square$ Quaternion $q \Rightarrow q = a + b \cdot i + c \cdot j + d \cdot k$

$a \in \mathbb{R}, u = (b, c, d)^T \in \mathbb{I}$

$q = (a, b, c, d)^T$ bzw. $q = (a, u)^T$

$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$

$ij = -ji = k$

$jk = -kj = i$

$ki = -ik = j$

Gegeben	$q = (a_q, u_q), r = (a_r, u_r)$
Addition	$q + r = (a_q + a_r, u_q + u_r)$
Skalar	$q \cdot r = a_q a_r + \langle u_q, u_r \rangle = a_q a_r + b_q b_r + c_q c_r + d_q d_r$
quatern. Multipl.	$q * r = (a_q + i \cdot b_q + j \cdot c_q + k \cdot d_q) \cdot (a_r + i \cdot b_r + j \cdot c_r + k \cdot d_r)$
konjugiert	$q^* = (a_q, -u_r)$
Norm	$ q = \sqrt{qq^*} = \sqrt{q^* q} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$
inverses Element	$q^{-1} = \frac{q^*}{ q ^2}$

Rotation mit Quaternionen

Vektor als Quaternion	$p = (x, y, z)^T \Rightarrow q = (0, p)^T$
Skalar als Quaternion	$s \Rightarrow q = (s, 0)^T$
Einheitsquaternion	$ q = 1$
Rotation um θ , Achse u	$q = (\cos(\frac{\theta}{2}), u \cdot \sin(\frac{\theta}{2}))$
Rotation Punkt v	$v' = qvq^* = qvq^{-1}$

Sinus

a	0	30	45	60	90	120	135	150	180
$\sin a$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos a$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1