#### MATH-F307 - Mathématiques discrètes

# Séance 2 (26 septembre 2018)

#### Exercice 1.

- 1. Soit une rangée de 5 chaises dans une pièce. Il y a 7 personnes dans la pièce. De combien de manières peut-on assoir 5 personnes le long de la rangée?
- 2. De combien de manières peut-on distribuer 10 livres (tous différents) si Elisa reçoit 5 livres, Mathieu 3 livres et Julie 2 livres?
- 3. Trois pots de confiture et trois pots de miel doivent être placé sur une étagère. De combien de manières peut-on arranger les pots afin qu'il y ait deux pots de confiture aux deux extrémités de l'étagère?

Exercice 2. Dans un jeu non-standard de 40 cartes (10 cartes de valeurs différentes dans 4 couleurs), combien de main de 4-cartes contiennent

- 1. 4 cartes d'une seule et même couleur?
- 2. 4 cartes de deux couleurs?
- 3. 4 cartes de trois couleurs?
- 4. 4 cartes de quatres couleurs?

**Exercice 3.** Une classe de 12 étudiants doit être divisé en groupes d'études de chacun trois étudiants. De combien de manière cela peut-il être fait si

- 1. les groupes ont tous des sujets d'étude différents?
- 2. les groupes étudient le même sujet?

Exercice 4. Donner deux démonstrations de

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n .$$

**Exercice 5.** Prouver, pour  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Exercice 6. Qu'obtient-on en dérivant la formule du binôme?

**Exercice 7.** Pour  $n \ge 1$ , que vaut la somme des coefficients binomiaux  $\binom{n}{k}$  avec k pair ?

**Exercice 8.** Dans le triangle de Pascal, montrer que le produit des 6 voisins d'un coefficient binomial  $\binom{n}{k}$  est toujours un carré parfait.

Exercice 9. Que vaut

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} ?$$

Exercice 10. Que vaut

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} ?$$

### Maths Discrètes

## Solutions TP 2

### Exercice 1

$$1. \binom{7}{5} = 21$$

$$2. \binom{10}{5} \binom{5}{3} \binom{2}{2} = 2520$$

3.  $\binom{4}{1} = 4$  ou  $\binom{4}{3} = 4$  puisque 4 emplacements et 1 pot de confiture, 3 pots de miel

#### Exercice 2

- 1.  $\binom{4}{1}\binom{10}{4} = 840$ , choix de la couleur puis des cartes
- 2.  $\binom{4}{2}\binom{10}{2}\binom{10}{2} + \binom{4}{1}\binom{10}{3}\binom{3}{1}\binom{10}{1}$ , choix des cartes pour une main de 2 cartes de chaque couleur, plus choix des cartes pour une main de 3 cartes d'une couleur, 1 de l'autre
- 3.  $\binom{4}{3}\binom{3}{1}\binom{10}{2}\binom{10}{2}\binom{10}{1}\binom{10}{1}$ , choix des couleurs puis de celle sur 2 cartes, puis choix des cartes
- 4.  $10^4$  ou  $\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \end{pmatrix}$

1. 
$$\binom{12}{3} \binom{9}{3} \binom{6}{3} \binom{3}{3}$$

2. 
$$\frac{\binom{12}{3}\binom{9}{3}\binom{6}{3}\binom{3}{3}}{4!}$$
, pour éviter les groupes répétés en ordre différent

### Exercice 4

Binome de Newton,

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1^k) (1^{n-k})$$
$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Nombre de représentations de  $\{1,\ldots,n\}$  en deux sous-ensembles

- ullet chaque élément n pris ou non pour le  $1^{\mathrm{er}}$  sous-ensemble,  $2^n$
- $\bullet\,$  chaque sous-ensemble, de taille k<br/>,  $\binom{n}{k}$

### Exercice 5

par le binome de Newton, si x = -1 et y = 1, alors

$$\sum_{k=0}^{n} {n \choose k} (-1)^k (1)^{n-k} = (-1+1)^n$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(-1\right)^k = 0$$

$$((x+y)^n)' = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \ y^{n-k}\right)'$$

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k \ x^{k-1} \ y^{n-k}$$

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k \ x^{k-1} \ y^{n-k}$$

$$\lim_{k \to \infty} comme \ \binom{n}{k} k = n \binom{n-1}{k-1} \lim_{k \to \infty} cm^{n-k}$$

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} \ y^{n-k},$$

$$n(x+y)^{n-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^k \ y^{n-1-k}$$

$$\Downarrow$$
 si on prend  $x=y=1$ , alors:  $\Downarrow$ 

$$n2^{n-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} {n-1 \choose k}$$
$$n2^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} {n \choose k} k$$

## Exercice 7

$$\sum_{k \text{ pair}=0}^{n} \binom{n}{k}; \text{ pour } (-1+1)^n;$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k (1)^{n-k} = 0$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = 0$$

$$\sum_{k \text{ pair}}^{n} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ impair}}^{n} \binom{n}{k} = 0$$

$$\sum_{k \text{ pair}}^{n} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ impair}}^{n} \binom{n}{k}$$

Dans le triangle de Pascal
$$\Rightarrow \binom{n-1}{k-1} \binom{n-1}{k} \binom{n}{k-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} \binom{n+1}{k} \binom{n+1}{k+1}$$

$$= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-k+1)!} \cdot \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \cdot \cdot \cdot$$

$$= \frac{(n-1)!^2 \ n!^2 \ (n+1)!^2}{(k-1)!^2(n-k)!^2(k+1)!^2(n-k-1)!^2k!^2(n-k+1)!^2}$$

$$= \binom{n-1}{k-1}^2 \binom{n}{k+1}^2 \binom{n+1}{k}^2$$

## Exercice 9

$$\sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} k \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

$$\Downarrow \text{ si } k = 0, \text{ le tout vaut } 0. \ k/k! \to 1/(k-1) \Downarrow$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{(k-1)! (n-k)!}$$

$$= n \sum_{k=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!}$$

$$\Downarrow \text{ où } L = k-1 \Downarrow$$

$$= n \sum_{L=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{L! (n-1-L)!}$$

$$= n 2^{n-1}$$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \frac{n! (n+1)}{(k+1) k! (n-k)!}$$

$$= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1}$$

$$\Downarrow \text{ pour arriver à } \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} = 2^{n+1}, \text{ il faut pour } k = 0 \Downarrow$$

$$= \frac{1}{n+1} \left( \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{0} - \binom{n+1}{0} \right)$$

$$= \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$$