

# Maths Discrètes

## Solutions TP 4

Rodrigue Sanchez Lopez

### Exercice 1

$$(n-1) + (n-2) + (n-3) + \cdots + 1 + 0$$

On a  $n$  éléments :

- Le 1er a une arête vers tous les autres nœuds :  $n-1$
- Le 2ème a une arête vers tous les autres nœuds sauf le 1er (déjà fait) :  $n-2$
- Le 3ème a une arête vers tous les autres nœuds sauf les deux précédents (déjà fait) :  $n-3$
- Etc ...
- L'avant dernier a une arête vers le dernier, les autres sont déjà fait : 1
- Le dernier est déjà relié à tous les autres nœuds, il n'y a rien à ajouter : 0

Cela nous donne :

$$(n-1) + (n-2) + (n-3) + \cdots + 1 + 0 = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

### Exercice 2

Rappel du « Handshaking theorem » :  $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

En Français : la somme du degré de tous les sommets ( $V$ ) vaut deux fois le nombre de sommet ( $E$ ) (Parce qu'une arête a deux extrémités : elle ajoute 1 au compte des degrés de chacune de ces extrémités).

**Pour 8 sommets avec chacun 3 arêtes, nous avons :**

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 8 * 3 = 24$$

24 est pair et « marche » donc dans  $24 = 2|E|$  : chaque arête a deux sommet.

**Pour 7 et 9 sommets avec chacun 3 arêtes, nous avons :**

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 7 * 3 = 21 \text{ et } \sum_{v \in V} \deg(v) = 9 * 3 = 27$$

21 et 27 ne sont pas pair et ne respectent donc pas  $2|E|$ , dans chacun de ces cas, une des arête n'a pas de « deuxième sommet ».

## Exercice 3

Dans un graphe a  $n$  sommets, il existe toujours deux nœuds de même degré :

Soit un graphe  $G = (V, E)$  alors :  $\exists a, b \in E : \deg(a) = \deg(b)$

**Démontrons cela par l'absurde :**

Tous les nœuds ont un degré différent.

Nous avons  $n$  nœuds auxquels nous devons attribuer  $n$  degrés différents. La répartition des degrés la plus pertinente est la suivante :

$$\{n-1, n-2, \dots, 0\}$$

Notons que un degré plus petit que 0 ou un degré plus grand que  $n-1$  n'ont pas de sens : On ne peut connaître un nombre négatif de personne, on ne peut se connaître soit-même (en plus de tous les autres : degré  $n$ ) et on ne connaît pas 2 fois une personne (degré  $> n$ ).

Selon cette répartition, nous avons donc que :

- Le premier nœud est donc relié à tous les autres nœuds :  $n-1$   
Il connaît donc tout le monde.
- Le dernier nœud est relié à aucun nœuds : 0  
Il ne connaît donc personne.

C'est impossible, nous ne pouvons pas avoir dans un même groupe une personne qui connaît tout le monde et en même temps une personne qui ne connaît personne.

Il est donc impossible que tous les nœuds aient des degrés différents donc au moins deux nœuds ont le même degré.

## Exercice 4

Nous avons un total de  $2n$  nœuds. Démontrons que ce graphe est connexe si le degré de chaque nœud est plus grand que  $n$ .

Commençons par diviser nos nœuds en deux sous-ensemble connexe de  $\frac{2n}{2} = n$  nœuds.

Prenons  $a$  dans le premier sous-ensemble et  $b$  dans le second sous-ensemble.

Dans leurs sous-ensembles respectif,  $a$  et  $b$  sont relié à tous les autres nœuds ( $n-1$ ), ils ont donc, dans leur sous-ensemble, un degré de  $n-1$ .

Nous avons deux possibilités :

**$a$  et  $b$  sont adjacent :** Ils ont donc un degré de, au moins  $(n - 1) + 1 = n$  et le graphe est connexe.

**$a$  et  $b$  ne sont adjacent :** Un degré de  $n - 1$  ne suffit pas à respecter la condition de l'énoncé. Ils doivent donc être relié à au moins un nœud de l'autre sous-ensemble pour avoir un degré de au moins  $n$ . Si les deux sous-ensemble sont relié, le graphe est connexe.

## Exercice 5

## Exercice 6

Déterminons le nombre de sommet si

- **G à 12 arêtes et tous les sommets sont de degré 3 :**

Utilisons le « Handshaking theorem » :  $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

$$\sum_{v \in V} 3 = 2 * 12$$

$$3 + 3 + (\dots) + 3 = 24$$

$$|V| * 3 = 24$$

$$|V| = \frac{24}{3} = 8$$

Il y a donc 8 sommets.

- **G à 10 arêtes avec 2 sommets de degré 3 et tous les autres de degré 2 :**

Séparons  $V$  en deux sous-ensemble :  $V_1$  qui contient les deux sommets de degré 3 et  $V_2$  qui contient les autres sommet de degré 2. Toujours avec le théorème des poignées de main :

$$\sum_{v \in V_1} 3 + \sum_{v \in V_2} 2 = 2 * 10$$

$$2 * 3 + \sum_{v \in V_2} 2 = 20$$

$$\sum_{v \in V_2} 2 = 20 - 6$$

$$|V_2| * 2 = 14$$

$$|V_2| = \frac{14}{2} = 7$$

Il y a donc 7 sommets de degré 3 ( $V_2$ ) et 2 sommets de degré 2 ( $V_1$ ). Le total est de 9 sommets.

## Exercice 7

$G$  à 65 arêtes et 40 sommets. Chaque sommet est soit de degré 3 ou 4.

Pour :

$x = \# \text{sommets de degré 3}$

$y = \# \text{sommets de degré 4}$

Nous avons :

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x + 4y = 2 * 65 = 130 \end{cases}$$

Isolons  $x$  :

$$x = 40 - y$$

Calculons  $y$  :

$$3(40 - y) + 4y = 130$$

$$120 - 3y + 4y = 130$$

$$-3y + 4y = 130 - 120$$

$$y = 10$$

Et maintenant  $x$  :

$$x = 40 - 10$$

$$x = 30$$


Nous avons donc :

- 30 sommets de degré 3
- 10 sommets de degré 4

## Exercice 8

### Exercice 8.1

$$\text{Inc} = \begin{bmatrix} & (e1) & (e2) & (e3) & (e4) & (e5) & (e6) \\ (a) & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ (b) & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ (c) & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ (d) & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ (e) & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ (f) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\text{Adj} = \begin{bmatrix} & (a) & (b) & (c) & (d) & (e) & (f) \\ (a) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ (b) & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ (c) & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ (d) & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ (e) & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ (f) & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

### Exercice 8.2

Ce graphe n'est pas biparti car il possède une boucle sur  $b$ .

### Exercice 8.3

(cfr théorème 42: slides 93 Chap2F307.pdf ou exemple 2 dans Revision.pdf)

Le nombre de circuit de taille  $n$  allant de  $v_i$  à  $v_j$  est  $(i, j)$  dans  $(Adj)^n$ .

$$\text{Commençons par calculer}^1 (Adj)^4 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 12 & 5 & 5 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 5 & 4 \\ 0 & 6 & 1 & 4 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Le nombre de circuit de longueur 4 dans  $G$  correspond à la somme des valeurs pour  $i = j$ , c'est à dire, la diagonal :  $2 + 12 + 6 + 3 + 5 + 7 = 35$ .

## Exercice 9

### Exercice 9.a

$$\begin{aligned} |V_{G_4}| &= 14, |E_{G_4}| = 24 \\ |V_{G_5}| &= 20, |E_{G_5}| = 35 \end{aligned}$$

### Exercice 9.b

$2 + (i - 1)$  sommets: 2 sommets au cercle puis 1 à chaque intersection intérieure.

### Exercice 9.c

$$\begin{aligned} |V_{G_n}| &= 2n + \sum_{i=0}^{n-1} i \\ &= 2n + \frac{(n-1)(n)}{2} \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>Ça n'est que du produit matriciel : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit\\_matriciel](https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_matriciel)

### Exercice 9.d

$2n$  sommets de degré 3 (autour du cercle)

$\sum_{i=0}^{n-1} i$  sommets de degré 4 (intersections internes)

$$|E|G_n = \frac{2*(2n)+4(\sum_{i=0}^{n-1} i)}{2} = 2n + 2 \sum_{i=0}^{n-1} i \quad 3n + (n-1)(n)$$

### Exercice 9.e

$$|V_{G_4}| = 2 * 4 + (3 + 2 + 1) = 14$$

$$|E_{G_4}| = 3 * 4 + 2 * (3 + 2 + 1) = 24$$

$$|V_{G_5}| = 2 * 5 + (4 + 3 + 2 + 1) = 20$$

$$|E_{G_5}| = 3 * 5 + 2 * (4 + 3 + 2 + 1) = 35$$